


التحليل الإحصائي للمتغيرات المتعددة

باستخدام برنامج

SPSS



إعداد

أسامي ربیع امین

قسم الإحصاء والرياضيات
كلية التجارة - جامعة المتوسطة

التحليل الإحصائي للمتغيرات المتعددة، باستخدام برنامج SPSS

SPSS

اسامة ربیع امین

المقدمة

الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا إلى إنجاز هذا الكتاب والذي يعد استكمالاً للكتاب الأول الذي أصدرناه في بداية العام السابق، وقد لاقى قبولاً واسعاً بفضل من الله من الباحثين في مختلف مجالات البحث العلمي، والذي تناول المهارات الأساسية المتقدمة لبرنامج SPSS ، مقاييس الإحصاء الوصفي ، التمثيل البياني ، شروط الاختبار العلمي ، الاختبارات المعلمية ، ثم الاختبارات اللامعلمية.

والكتاب الحالي وهو بعنوان " التحليل الإحصائي للمتغيرات المتعددة باستخدام SPSS " ، يغطي الموضوعات التالية :

- تحليل التباين ANOVA
- تحليل التباين المتعدد MANOVA
- تحليل التغير المشترك ANCOVA
- تحليل التغير المشترك المتعدد MANCOVA
- تحليل الارتباط (البسيط – الجزئي) Correlation Analysis
- تحليل الانحدار (البسيط – المتعدد) Regression Analysis
- التحليل العامل Factor Analysis

قد رأينا في هذا الكتاب السهولة والبساطة حتى يستطيع القارئ غير المتخصص في علم الإحصاء الإمام بمفهوم وشروط وطريقة تفسير النتائج في تحليل المتغيرات المتعددة بشكل واضح بعيد عن أي تعقيد زائد عن اللزوم ، ويأمل المؤلف أن ينال هذا

الكتاب رضاء الطالب والباحث العربي وأن يكون خيراً عوناً له في فهم هذه الموضوعات.

هنا، ومن الأهمية بمكان التأكيد على أمر هام وهو أن هذا الكتاب ليس مرجع إحصائي بل هو دليل يشرح طريقة تطبيق التحليلات الإحصائية للمتغيرات المتعددة وكيفية تفسير النتائج باستخدام برنامج SPSS.

وفي النهاية، وانه لمن دواعي سرورنا أن نتلقى منكم أي استفسار أو تعليق عن سهو أو خطأ تجدونه في هذا الكتاب، وذلك عن طريق الاتصال بالمؤلف إما هاتفياً (0020109787442) أو من خلال البريد الإلكتروني (osama.rabie@yahoo.Com). والله الموفق.

المؤلف

أسامة ربيع أمين سليمان

القاهرة – يوليو 2008

المحتويات

الفصل الأول

1 مقدمة عن الفرق بين تحليل التباين وتحليل التغير

الفصل الثاني

7 تحليل التباين الأحادي (ANOVA)

الفصل الثالث

41 تحليل التباين المتعدد (MANOVA)

الفصل الرابع

63 تحليل التغير الأحادي (ANCOVA)

الفصل الخامس

71 تحليل التغير المتعدد (MANCOVA)

الفصل السادس

79 تحليل الارتباط Correlation Analysis

الفصل السابع

101 **تحليل الانحدار الخطي البسيط Simple Linear Regression Analysis**

الفصل الثامن

143 **تحليل الانحدار الخطي المتعدد Multiple Linear Regression**

الفصل التاسع

175 **التحليل العائلي Factor Analysis**

ζ

الفصل الأول

**مقدمة عن الفرق بين
(تحليل التباين – تحليل التغير)**

الفصل الأول

مقدمة عن الفرق بين تحليل التباين وتحليل التغير

أولاً : تحليل التباين ANOVA

بصفة عامة، تحليل التباين يمثل علاقة خطية بين واحد أو أكثر من المتغيرات التابعية، و واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة. ويشرط أن تكون المتغيرات التابعية غير متربة، أما المتغيرات المستقلة فيمكن أن تكون متربة أو غير متربة أو الاثنين معا.

ملاحظات :

١. من أمثلة المتغير المترتب: الطول – الوزن – الأرباح – درجات الحرارة..... الخ.

٢. أما المتغير غير المترتب: فقد يكون:

أ. غير ترتيبى: مثل النوع (ذكر – أنثى)، الحالة الاجتماعية (أعزب – متزوج – أرمل – مطلق) الخ

ب. أو ترتيبى: مثل المستوى التعليمي (أمي – ثانوية عامة – جامعي – دراسات عليا)، المستوى الاقتصادي (دخل منخفض – دخل متوسط – دخل مرتفع) الخ.

أنواع تحليل التباين

يتحدد نوع تحليل التباين حسب عدد كل من: المتغيرات التابعه والمتغيرات المستقلة في النموذج، كما هو موضح بالشكل التالي:

عدد المتغيرات المستقلة			بيان	
N متغير مستقل	2	1		
N – way ANOVA تحليل التباين الأحادي في (N) اتجاه	Two – way ANOVA تحليل التباين الأحادي في اتجاهين	One – way ANOVA تحليل التباين الأحادي في اتجاه واحد	1	
N – way MANOVA تحليل التباين المتعدد في (N) اتجاه	Two – way MANOVA تحليل التباين المتعدد في اتجاهين	One – way MANOVA تحليل التباين المتعدد في اتجاه واحد	أكبر من متغير تابع	متغير تابع

ثانياً : تحليل التغير

يوجد نوعين من تحليل التغير (والذي يطلق عليه في بعض الأحيان تحليل التباين المشترك):

١. تحليل التغير الأحادي ANCOVA

تحليل التغير الأحادي ANCOVA هو نفسه تحليل التباين الأحادي ANOVA [سواء في اتجاه واحد أو اثنين أو (ن) اتجاه]، ولكن مع اختلاف واحد وهو أنه في تحليل ANCOVA يتم استبعاد أثر متغير ما (أو أكثر) من المتغيرات ذات العلاقة مع المتغير التابع^(١). وذلك في حالة الاعتقاد بأن الاختلاف في المتغير التابع يتتأثر بمتغير آخر من خارج النموذج بخلاف المتغيرات المستقلة، في هذه الحالة فإنه يتعين استبعاد أثر هذا المتغير.

مثال ذلك: عند دراسة الفروق المعنوية في مستوى الطلاب في مادة الرياضيات في الجامعات المختلفة، فإنه للوصول إلى حكم سليم حول مدى تأثير نوع الجامعة (المتغير المستقل) على الاختلاف في مستوى الطلاب (المتغير التابع) ، فلابد من استبعاد أثر مستوى ذكاء الطلاب (المتغير الحاكم).

وغنى عن البيان أنه: إذا لم يتم الأخذ في الاعتبار مستوى الذكاء بحيث يقتصر التحليل على دراسة معنوية الفروق بين مستوى الطلاب في الجامعات المختلفة مباشرة، في هذه الحالة تكون بصدق تحليل .ANOVA تباين

^(١) يسمى المتغير الذي يستبعد تأثيره بالمتغير الحاكم Control Variable، وأحياناً يسمى بـ Covariates.

الخلاصة:

في تحليل التباين المشترك ANCOVA تكون بصدق متغير واحد تابع وواحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة مع استبعاد أثر واحد (أو أكثر) من المتغيرات الحاكمة.

2. تحليل التغير المتعدد MANCOVA

تحليل التغير المتعدد MANCOVA هو نفسه تحليل التباين المتعدد [سواء في اتجاه واحد أو اثنين أو (ن) اتجاه]، ولكن بعد استبعاد أثر متغير ما (أو أكثر) من المتغيرات ذات العلاقة مع المتغيرات التابعة (التي تسمى كما سبق وأن أشرنا بالمتغيرات الحاكمة Covariates أو Control Variable).

إذا:

في تحليل التغير المتعدد MANCOVA تكون بصدق علاقة بين أكثر من متغير تابع وواحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة مع استبعاد أثر واحد (أو أكثر) من المتغيرات الحاكمة.

الخلاصة

تحليل التباين أو التغير إما أن يكون آحادي أو متعدد حسب عدد المتغيرات التابعة في النموذج. وذلك في اتجاه واحد أو اثنين أو N اتجاه حسب عدد المتغيرات المستقلة.

الفصل الثاني

تحليل التباين الاحادي

Analysis of Variance (ANOVA)

الفصل الثاني

تحليل التباين الأحادي

Analysis of Variance (ANOVA)

في هذا الفصل سوف نتناول ثلاثة أنواع من تحليل التباين الأحادي:

1. تحليل التباين الأحادي في اتجاه واحد One – Way ANOVA

2. تحليل التباين الأحادي في اتجاهين Two – Way ANOVA

3. تحليل التباين الأحادي في "ن" N – Way ANOVA

أولاً: تحليل التباين الأحادي في اتجاه واحد One – Way ANOVA

مقدمة:

في تحليل التباين الأحادي في اتجاه واحد: تكون بصدق متغير واحد تابع، ومتغير واحد مستقل.

مثال ذلك:

لو أثنا نريد المقارنة بين أداء الطلاب في إحدى المواد الدراسية المقررة، في ثلاث جامعات (جامعة حكومية – جامعة وطنية خاصة – جامعة أجنبية)، أي أثنا نريد الإجابة على السؤال التالي:

هل هناك اختلاف (أو فروق معنوية) بين مستوى الطلاب في هذه الجامعات أم لا؟ . وهذا السؤال – أيضاً – يعني أننا نريد دراسة مدى معنوية تأثير نوع ملكية الجامعة (المتغير المستقل) على مستوى أداء الطلاب (المتغير التابع). في هذه الحالة نجري تحليل التباين الأحادي في اتجاه واحد.

مثال آخر:

إذا كنا نريد المقارنة بين متوسط الدخول لمجموعة من الأفراد حسب المستوى التعليمي لهم. أي أننا نريد الإجابة على السؤال التالي: هل هناك اختلاف في متوسط دخل الفرد وفقاً لمستوى التعليم الذي حصل عليه؟ .

وهذا السؤال يعني أننا نريد دراسة مدى معنوية تأثير المستوى التعليمي (المتغير المستقل) على مستوى الدخول (المتغير التابع). أيضاً، في هذه الحالة نجري تحليل التباين الأحادي في اتجاه واحد.

مثال عملي:

إذا توافر لديك البيانات التالية الخاصة بدرجات مجموعة من الطلاب في مادة الحاسوب الآلي في كل من جامعة المنصورة – جامعة الزقازيق – جامعة المنوفية :

المطلوب:

اختبار مدى وجود فروق معنوية في مستوى الطلاب في مادة الحاسوب الآلي بين الجامعات الثلاثة أم لا؟ وذلك عند درجة ثقة 95٪.

جامعة الموفية	جامعة الزقازيق	جامعة المنصورة
15	14	6
17	15	12
15	10	4
10	12	7
14	6	5
6	10	6
13	13	4
14	18	16
10	*	7
15	*	*
2	*	*

صياغة الفروض الإحصائية في حالة تحليل التباين الأحادي في اتجاه واحد : (بالتطبيق على المثال الحالي) :

الفرض العددي (H_0) : لا يوجد اختلاف في مستوى الطلاب بين الجامعات الثلاثة في مادة الحاسب الآلي (أو أن متوسط درجات الطلاب في مادة الحاسب الآلي في الجامعات الثلاثة متساوي).

الفرض البديل (H_1) : يوجد اختلاف في مستوى الطلاب في مادة الحاسب الآلي بين اثنين على الأقل من الجامعات الثلاثة (أو يوجد اثنين على الأقل من المتوسطات غير متساويين).

الفروض الإحصائية بشكل آخر:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

H_I : اثنين على الأقل من المتوسطات غير متساوية

إدخال البيانات: بما أننا بصدور عينات مستقلة⁽¹⁾، إذا سيتم إدخال البيانات كما يلي:

	y	x	var	
1	15.00	1.00		
2	17.00	1.00		
3	15.00	1.00		
4	10.00	1.00		
5	14.00	1.00		
6	6.00	1.00		
7	13.00	1.00		
8	14.00	1.00		
9	10.00	1.00		
10	15.00	1.00		
11	2.00	1.00		
12	14.00	2.00		
13	15.00	2.00		
14	10.00	2.00		
15	12.00	2.00		
16	6.00	2.00		
17	10.00	2.00		
18	13.00	2.00		
19	18.00	2.00		
20	6.00	3.00		
21	12.00	3.00		
22	4.00	3.00		
23	7.00	3.00		
24	5.00	3.00		
25	6.00	3.00		
26	4.00	3.00		
27	16.00	3.00		
28	7.00	3.00		
29				


ملحوظة: تم إدخال البيانات في عمودين:

العمود الأول: يتضمن قيم الظاهرة محل الدراسة وهي درجات الطلاب في الجامعات الثلاثة (المتغير التابع).

العمود الثاني: يتضمن الأكواد الخاصة بالحالات المختلفة للمتغير المستقل.

خطوات تنفيذ الاختبار:

- 1) افتح قائمة Analyze ، ومن القائمة الفرعية لـ Compare Means اختر One – way ANOVA



- 2) في المربع الحواري الذي أمامك:
 - أ- انقل المتغير (y) إلى المربع الذي بعنوان Dependent List
 - ب- ثم قم بنقل المتغير الخاص بالأكواد (X) إلى المربع الذي بعنوان Factor
 - ج- ثم اضغط Ok ، سوف تظهر لك النافذة الخاصة بمخرجات هذا الاختبار.

مكونات نافذة المخرجات

ت تكون صفة المخرجات من جدول واحد كما هو مبين بالشكل التالي:

Oneway

ANOVA					
y	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	130.226	2	65.113	3.816	.036
Within Groups	426.631	25	17.065		
Total	556.857	27			

تفريغ النتائج والتعليق:

نتائج اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد

ANOVA

P.Value	قيمة (ف) المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
0.036	3.816	65.113	2	130.226	بين المجموعات
*	*	17.065	25	426.631	داخل المجموعات
*	*	*	27	556.857	الإجمالي

التعليق على النتائج:

يلاحظ من جدول تحليل التباين السابق أن قيمة P.Value تساوى (0.036) أي (3.6٪) وهي أقل من مستوى المعنوية (5٪)، وبالتالي نرفض الفرض العددي، ونقبل الفرض البديل القائل بأن هناك أثنتين على الأقل من المتوسطات غير متساوية، بمعنى أن

هناك جامعتين على الأقل من الجامعات الثلاثة تكون درجات مادة الحاسب الآلي غير متساوية.

تحديد مصدر الاختلاف:

يقصد به تحديد ما هي الجامعات التي تختلف فيما بينها. يعنى آخر: هل الاختلاف بين جامعة المنصورة وجامعة الزقازيق؟، أم بين جامعة المنصورة وجامعة المنوفية؟، أم هو بين جامعة الزقازيق وجامعة المنوفية؟.


ويقدم لنا برنامج SPSS أسلوب المقارنات المتعددة [والذي يعرف بالاختبارات البعدية (Post Hoc)] لتحديد مصدر الاختلاف.

تحليل التباين في اتجاه واحد – والاختبارات البعدية (Post Hoc)


قبل أن نبدأ في شرح خطوات تنفيذ هذا الاختبار ، لابد وأن نؤكّد على أمر هام وهو أننا لا نهتم بنتائج هذه الاختبارات إلا عندما يتم رفض الفرض العددي في تحليل التباين في اتجاه واحد .ANOVA

خطوات تنفيذ هذا الاختبار:

- 1) من المربع الحواري التالي ، افتح الاختيار **Post Hoc...**



(2) سوف يظهر لك المربع الحواري الخاص بالاختبارات البعدية، كما يلي:



(3) قم باختيار أحد الاختبارات البعدية – بافتراض التجانس – ولتكن اختبار LSD (اختبار أقل فرق معنوي).

(4) ثم اضغط Continue ، للعودة مرة أخرى للمربع الحواري السابق.

(5) اضغط Ok ، ستظهر لك نافذة المخرجات الخاصة بهذا الاختبار.

مكونات نافذة المخرجات: تتكون من جدولين:

الجدول الأول: جدول ANOVA كما سبق.

والجدول الثاني: وهو جدول المقارنات المتعددة

الموضح بالشكل التالي:

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Dependent Variable: y

LSD

() x	(J) x	Mean Difference (- J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1.00	2.00	-.34091	1.91952	.860	-4.2942	3.6124
	3.00	4.46465*	1.85675	.024	.6406	8.2887
2.00	1.00	.34091	1.91952	.860	-3.6124	4.2942
	3.00	4.80556*	2.00731	.024	.6714	8.9397
3.00	1.00	-4.46465*	1.85675	.024	-8.2887	-.6406
	2.00	-4.80556*	2.00731	.024	-8.9397	-.6714

*. The mean difference is significant at the .05 level.

تفريغ النتائج والتعليق: جدول المقارنات المتعددة:

P.Value	متوسط الفرق	المقارنات الشائنة
0.860	- 0.34091	(1) مع (2)
0.024	-4.464	(1) مع (3)
0.024	- 4.805	(2) مع (3)

لا تنسى:

أن (1) هو الكود الخاص بجامعة المنوفية، (2) هو الكود الخاص بجامعة الزقازيق، (3) هو الكود الخاص بجامعة المنصورة.

التعليق على النتائج:

يتضح من الجدول السابق أن: هناك اختلاف معنوي بين جامعة المنصورة وكل من جامعة الزقازيق وجامعة المنوفية، حيث أن قيمة P.Value في الحالتين تساوى (0.024) أي (2.4٪) وهي أقل من (5٪). في حين أن الاختلاف بين جامعة الزقازيق وجامعة المنوفية كان غير معنوياً ، حيث أن قيمة P.Value تساوى (0.860) أي (86٪) وهي أكبر من (5٪).

ثانياً: تحليل التباين الأحادي في اتجاهين Two – Way ANOVA

مقدمة: في تحليل التباين الأحادي في اتجاهين: تكون بصدق متغير واحد تابع، ومتغيرين مستقلين. وهنا يجب أن نفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: في حالة تجاهل التفاعل (أو التأثير المتبادل) بين المتغيرين المستقلين على الاختلاف في المتغير التابع⁽¹⁾:

مثال عملي:

إذا توافرت لديك البيانات التالية والخاصة بعدد الكيلومترات التي تقطعها كل سيارة في الساعة الواحدة (حسب نوع السيارة ونوع البنزين المستخدم):

Fiat	Cetron	BMW	Mercedes	بيان
95	110	155	160	بنزين 80
105	140	145	140	بنزين 90
85	145	165	170	بنزين 96

المطلوب:

دراسة هل هناك فرق معنوي في متوسط السرعة (المتغير التابع) :

▪ حسب نوع السيارة (المتغير المستقل الأول).

▪ حسب نوع البنزين (المتغير المستقل الثاني).

وذلك عند درجة ثقة 95 % .

شكل الفروض الإحصائية في حالة تحليل التباين في اتجاهين:

♦ الاتجاه الأول [تأثير المتغير المستقل الأول (نوع أو ماركة السيارة)]:

الفرض العدمي (H₀): تأثير نوع السيارة على سرعة السيارة غير معنوي .

الفرض البديل (H₁): تأثير نوع السيارة على سرعة السيارة معنوي .

♦ الاتجاه الثاني [تأثير المتغير المستقل الثاني (نوع البنزين)]:

الفرض العدمي (H₀): تأثير نوع البنزين على سرعة السيارة غير معنوي .

الفرض البديل (H₁): تأثير نوع البنزين على سرعة السيارة معنوي .

إدخال البيانات:

يتم إدخال البيانات في 3 أعمدة:

العمود الأول: يتضمن قيم المتغير التابع وهي متوسط سرعة السيارة في الساعة

الواحدة.

العمود الثاني: يتضمن الأكواب الخاصة بالحالات المختلفة بالمتغير المستقل الأول

(نوع السيارة).

العمود الثالث: يتضمن الأكواواد الخاصة بالحالات المختلفة بالتغير المستقل


الثاني (نوع البنزين).

	y	x1	x2	var
1	160.00	1.00	1.00	
2	140.00	1.00	2.00	
3	170.00	1.00	3.00	
4	155.00	2.00	1.00	
5	145.00	2.00	2.00	
6	165.00	2.00	3.00	
7	110.00	3.00	1.00	
8	140.00	3.00	2.00	
9	145.00	3.00	3.00	
10	95.00	4.00	1.00	
11	105.00	4.00	2.00	
12	85.00	4.00	3.00	
13	.	.	.	
14	.	.	.	
15	.	.	.	

خطوات تنفيذ الاختبار


- 1) افتح قائمة **Analyze** ، ومن القائمة الفرعية لـ **Linear Model** اختر **Univariate..** ، سوف يظهر لك المربع الحواري التالي:

تحليل التباين الاحادي ANOVA



في المربع الحواري الذي أمامك:

- **Dependent** أدخل المتغير التابع [y] في المربع الذي بعنوان **Variable:**
- ثم قم بإدخال المتغيرات المستقلة **[x1]** ثم **[x2]** في المربع الذي بعنوان **.Fixed Factor(s):**
- ثم أنقر فوق الاختيار **Model**، لفتح المربع الحواري التالي:



في هذا المربع الحواري: قم بتنفيذ ما يلي:

- أ . اختر **Full factorial** بدلا من **Custom**.
 - ب . قم بنقل المتغير **x1** ثم المتغير **x2** من المربع الذي بعنوان **Factors & Covariates** إلى المربع الذي بعنوان **Model**.
 - ج . ثم اختر **Main effects** بدلا من **Interaction**.
 - د . ثم اضغط **Continue**، للعودة للمربع الحواري السابق.
- (١) ثم اضغط **ok** ، سنحصل في صفحة المخرجات على النتائج التالية :

Tests of Between-Subjects Effects					
Dependent Variable: Dependent Variable					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	7718.750 ^a	5	1543.750	7.102	.017
Intercept	217352.083	1	217352.083	999.958	.000
x1	7439.583	3	2479.861	11.409	.007
x2	279.167	2	139.583	.642	.559
Error	1304.167	6	217.361		
Total	226375.000	12			
Corrected Total	9022.917	11			

a. R Squared = .855 (Adjusted R Squared = .735)

يلاحظ هنا: أن هذا الجدول يتضمن النتائج الخاصة بنموذج الانحدار العام، إلا أننا سوف نركز على البيانات الخاصة بتحليل التباين فقط، لذا سنقوم بإعداد جدول جديد كما موضح بالصفحة التالية.

التعليق:

- من جدول تحليل التباين الموضح بالصفحة التالية، يتضح لنا :
- أ . معنوية تأثير نوع السيارة حيث أن P.Value تساوي (0.007) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) ، إذا القرار هو رفض الفرض العددي وقبول الفرض البديل.
 - ب . كما يتضح عدم معنوية تأثير نوع البنزين حيث أن P.Value تساوي (0.559) وهي أكبر من مستوى المعنوية (0.05) ، إذا القرار هو قبول الفرض العددي.

جدول تحليل التباين ANOVA

P.Value	قيمة (ف) المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباین
0.007	11.409	2479.861	3	7439.583	المتغير المستقل الأول (نوع السيارة)
0.559	0.642	139.583	2	279.167	المتغير المستقل الثاني (نوع البنزين)
*	*	217.361	6	1304.167	الخطأ
*	*	*	11	9022.917	الإجمالي

الحالة الثانية: في حالة الاخذ في الاعتبار التفاعل أو التأثير المتبادل بين المتغيرين المستقلين:

مثال عملي:

في دراسة لمعرفة مدى تأثير كل من المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية لرجل البيع على

حجم المبيعات الشهرية التي يحققها ، تم تجميع البيانات التالية :

تحليل التباين الاتحادي ANOVA

بيان						
أمي	ابتدائي	ثانوي	متوسط	جامعي		
130	110	125	130	130	أعزب	رجل
140	115	120	120	120	متزوج	
135	95	104	125	125	أعزب	أنثى
122	107	88	100	100	متزوج	

المطلوب:

اختبار هل هناك فروق معنوية بين متوسطات المبيعات الشهرية:

أ . بسبب عامل المستوى التعليمي Educational Level (المتغير المستقل الأول).

ب . بسبب عامل الحالة الاجتماعية Marital status (المتغير المستقل الثاني).

ج . بسبب التفاعل بين المتغيرين المستقلين معا: المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية (Educational Level * Marital status).

وذلك عند درجة ثقة 95 % .

شكل الفروض الإحصائية في حالة تحليل التباين في اتجاهين:

♦ الاتجاه الأول (تأثير الحالة الاجتماعية):

الفرض العددي (H0): تأثير الحالة الاجتماعية على متوسط المبيعات الشهرية لرجل البائع غير معنوي.

الفرض البديل (١٣): تأثير الحالة الاجتماعية على متوسط المبيعات الشهرية لرجل البيع معنوي.

♦ الاتجاه الثاني (تأثير المستوى التعليمي):

الفرض العدمي (٤٥): تأثير المستوى التعليمي على متوسط المبيعات الشهرية لرجل البيع غير معنوي.

الفرض البديل (١٤): تأثير المستوى التعليمي على متوسط المبيعات الشهرية لرجل البيع معنوي.

♦ التفاعل بين المتغيرين المستقلين (المستوى التعليمي و الحالة الاجتماعية):

الفرض العدمي (٤٦): التأثير المتبادل بين المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية على متوسط المبيعات الشهرية لرجل البيع غير معنوي.

الفرض البديل (١٥): التأثير المتبادل بين المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية على متوسط المبيعات الشهرية لرجل البيع معنوي.

لاحظ هنا:

أنه – بالنسبة للفرضيات الإحصائية – قد تم إضافة الفرض الخاص بالتأثير المتبادل بين المتغيرين المستقلين.

إدخال البيانات:

The screenshot shows the SPSS Data Editor window titled "Untitled - SPSS Data Editor". The menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Add-ons, Window, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays a data table with four columns: y, x1, x2, and val. The rows are numbered from 1 to 21. The data values are as follows:

	y	x1	x2	val
1	100.00	1.00	1.00	
2	120.00	1.00	2.00	
3	111.00	1.00	1.00	
4	110.00	1.00	2.00	
5	110.00	2.00	1.00	
6	115.00	2.00	2.00	
7	95.00	2.00	1.00	
8	107.00	2.00	2.00	
9	125.00	3.00	1.00	
10	115.00	3.00	2.00	
11	104.00	3.00	1.00	
12	88.00	3.00	2.00	
13	130.00	4.00	1.00	
14	120.00	4.00	2.00	
15	125.00	4.00	1.00	
16	100.00	4.00	2.00	
17	130.00	5.00	1.00	
18	140.00	5.00	2.00	
19	135.00	5.00	1.00	
20	122.00	5.00	2.00	
21				

At the bottom, there are buttons for Data View and Variable View, and a status bar that says "SPSS Proc".

ثم من نافذة ضبط خصائص المتغيرات (Variable View) يتم كتابة عناوين أو مسميات المتغيرات (Label) كما يلي :

The screenshot shows the SPSS Data Editor window with the "Variable View" tab selected. The menu bar is identical to the previous screenshot. The main area displays a table with columns: Name, Type, Width, Decimals, Label, and Values. The rows are numbered from 1 to 6. The data is as follows:


	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	y	Numeric	8	2	Dependent Variable	None
2	x1	Numeric	8	2	Educational level	None
3	x2	Numeric	8	2	Marital Status	None
4						
5						
6						

A black oval highlights the "Label" column for the x2 variable. At the bottom, there are buttons for Data View and Variable View, and a status bar that says "SPSS Processor is ready".

خطوات تنفيذ الاختبار:

(١) افتح قائمة **GLM Linear Model**، ومن القائمة الفرعية لـ **Analyze**

اختر .. **Univariate** ، سوف يظهر لك المربع الحواري التالي:



في المربع الحواري الذي أمامك :

أ. أدخل المتغير التابع **[y]** في المربع الذي

. **Dependent Variable:** بعنوان


ب . ثم قم بإدخال المتغيرات المستقلة **[x1]** ثم **Educational Level**

Fixed Factor(s): **Marital status** في المربع الذي بعنوان

.**Factor(s):**

ج . ثم أنقر فوق الاختيار **Model** ، لفتح المربع الحواري التالي :

تحليل التباين الاتحادي



في المربع الحواري الذي أمامك :

أ. . أختر **Full factorial**

ب. . ثم اضغط **Continue**، للعودة للمربع الحواري السابق.

(2) ثم اضغط **ok** ، سنحصل على النتائج التالية :

Tests of Between-Subjects Effects					
Dependent Variable: Dependent Variable					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	2376.800 ^a	9	264.089	2.152	.124
Intercept	264960.200	1	264960.200	2159.415	.000
x1	1736.800	4	434.200	3.539	.048
x2	39.200	1	39.200	.319	.584
x1 * x2	600.800	4	150.200	1.224	.360
Error	1227.000	10	122.700		
Total	268564.000	20			
Corrected Total	3603.800	19			

a. R Squared = .660 (Adjusted R Squared = .353)

من الجدول الذي أمامك، نقوم بإعداد الجدول التالي :

P.Value	قيمة (ف) المحسوبة	متوسط الربعات	درجات الحرية	مجموع الربعات	مصدر البيان
0.048	3.539	434.2	4	1736.8	المتغير المستقل الأول (المستوى (التعليمي)
0.584	0.319	39.2	1	39.2	المتغير المستقل الثاني (الحالة (الاجتماعية)
0.360	1.224	150.2	4	600.8	التأثير المتبادل بين المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية
*	*	122.7	10	1227	الخطأ
*	*	*	19	3603.8	الإجمالي

التعليق:

يتضح من جدول تحليل التباين:

أ . معنوية تأثير المستوى التعليمي حيث أن $P.Value$ تساوي 0.048 وهي أقل من مستوى المعنوية 0.05 ، إذا القرار هو رفض الفرض العددي وقبول الفرض البديل.

ب . عدم معنوية تأثير الحالة الاجتماعية حيث أن $P.Value$ تساوي 0.584 وهي أكبر من مستوى المعنوية 0.05 ، إذا القرار هو قبول الفرض العددي.

ج . كما يتضح – أيضاً - عدم معنوية التأثير المتبادل بين المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية حيث أن $P.Value$ تساوي 0.360 وهي أكبر من مستوى المعنوية 0.05 ، إذا القرار هو قبول الفرض العددي.


ملحوظة هامة:

في بعض الأحيان يتعدى إدخال التأثير المتبادل بين المتغيرات المستقلة في النموذج بسبب عدم كفاية درجات الحرية، لأنه في هذه الحالة لا نستطيع الحصول على قيمة (F) حيث تكون درجات الحرية المقابلة للخطأ (Error) تساوي صفر. وبالتالي يكتفى بالتأثيرات الأساسية (Main effects) فقط لكل متغير مستقل على حده.

مثلاً في المثال الخاص بتأثير نوع السيارة ونوع البنزين: بفرض أن المطلوب: إظهار التفاعل بين كل من نوع السيارة ونوع البنزين على السرعة.

الخطوات:

(1) قم بتكرار الخطوة (1) ، (2) حتى يظهر المربع الحواري التالي:



في المربع الحواري الذي أمامك: (2)

أ. اختر **Full factorial**.

ب. ثم اضغط **Continue** للعودة للمربع الحواري الأساسي.

ثم اضغط **Ok**، سوف نحصل على النتائج التالية: (3)

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Dependent Variable

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	9022.917 ^a	11	820.265	.	.
Intercept	217352.083	1	217352.083	.	.
x1	7439.583	3	2479.861	.	.
x2	279.167	2	139.583	.	.
x1 * x2	1304.167	6	217.361	.	.
Error	.000	0	.	.	.
Total	226375.000	12			
Corrected Total	9022.917	11			

a. R Squared = 1.000 (Adjusted R Squared = .)

يلاحظ هنا أنه لا توجد قيم لـ (F)، وذلك لعدم كفاية درجات الحرية. حيث أن درجات الحرية للخطأ (Error) تساوي صفر. في هذه الحالة، فإننا نعود إلى المربع الحواري في

الخطوة (1) [Univariate Model] ونختار Custom بدلاً من Full .Main effects، ثم نختار factorial

N – Way ANOVA

ثالثاً: تحليل التباين الأحادي في (ن) اتجاه

مقدمة : في تحليل التباين الأحادي في "ن" اتجاه: تكون بصدق متغير واحد تابع، و "ن" من المتغيرات المستقلة. وهنا – أيضاً – يجب أن ينفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: في حالة تجاهل التفاعل (أو التأثير المتبادل) بين المتغيرات المستقلة:

مثال عملي

في دراسة لمعرفة مدى تأثير كل من عامل ملكية الجامعة (حكومية – خاصة)، والنوع (ذكر – أنثى)، ومدى انتظام الطالب في الحضور (منتظم – غير منتظم)، على مستوى أداء الطلاب في مادة الإحصاء، فقد تم تجميع البيانات التالية:

جامعة خاصة				جامعة حكومية			
طالبات		طلاب		طالبات		طلاب	
غير منتظم	منتظم	غير منتظم	منتظم	غير منتظم	منتظم	غير منتظم	منتظم
14	4	9	12	17	12	6	6
10	11	5	13	10	14	4	5
13	16	6	6	9	8	5	7

المطلوب:

اختبار هل هناك فرق معنوي بين متوسطات درجات الطلاب في مادة الإحصاء (المتغير التابع):

- أ . بسبب عامل ملكية الجامعة (المتغير المستقل الأول).
- ب . بسبب عامل الجنس (النوع) (المتغير المستقل الثاني).
- ج . بسبب عامل الانتظام في حضور المحاضرات في الجامعة (المتغير المستقل الثالث)، وذلك عند درجة ثقة 95 % ؟ .

شكل الفروض الإحصائية في حالة تحليل التباين في ^(٩) اتجاه:

♦ الاتجاه الأول: متغير نوع الملكية (عام - خاص):

الفرض العددي (١٠): تأثير نوع ملكية الجامعة على متوسط درجات الطلاب في مادة الإحصاء غير معنوي.

الفرض البديل (١١): تأثير نوع ملكية الجامعة على متوسط درجات الطلاب في مادة الإحصاء معنوي.

♦ الاتجاه الثاني: عامل الجنس (النوع):

الفرض العددي (١٠): تأثير الجنس (النوع) على متوسط درجات الطلاب في مادة الإحصاء غير معنوي.

الفرض البديل (١١): تأثير الجنس (النوع) على متوسط درجات الطلاب في مادة الإحصاء معنوي.

♦ الاتجاه الثالث: عامل المواظبة على الحضور:


الفرض العددي (١٠): تأثير عامل المواظبة على الحضور على متوسط درجات الطلاب في مادة الإحصاء غير معنوي.

الفرض البديل (١) : تأثير عامل المراقبة على الحضور على متوسط درجات الطالب في مادة الإحصاء معنوي.

ادخال البيانات :


	y	x1	x2	x3	v8
1	6.00	1.00	1.00	1.00	
2	5.00	1.00	1.00	1.00	
3	7.00	1.00	1.00	1.00	
4	6.00	1.00	1.00	2.00	
5	4.00	1.00	1.00	2.00	
6	5.00	1.00	1.00	2.00	
7	12.00	1.00	2.00	1.00	
8	14.00	1.00	2.00	1.00	
9	8.00	1.00	2.00	1.00	
10	17.00	1.00	2.00	2.00	
11	10.00	1.00	2.00	2.00	
12	9.00	1.00	2.00	2.00	
13	12.00	2.00	1.00	1.00	
14	13.00	2.00	1.00	1.00	
15	6.00	2.00	1.00	1.00	
16	9.00	2.00	1.00	2.00	
17	5.00	2.00	1.00	2.00	
18	6.00	2.00	1.00	2.00	
19	4.00	2.00	2.00	1.00	
20	11.00	2.00	2.00	1.00	
21	16.00	2.00	2.00	1.00	
22	14.00	2.00	2.00	2.00	
23	10.00	2.00	2.00	2.00	
24	13.00	2.00	2.00	2.00	

افتح قائمة **Analyze** ، ومن القائمة الفرعية **Linear Model GLM** (١)
اختر .. **Univariate** ، سوف يظهر لك المربع الحواري التالي:



في المربع الحواري الذي أمامك:

- أدخل المتغير التابع **y** في المربع الذي بعنوان **Dependent Variable**:
- ثم قم بإدخال المتغيرات المستقلة [**x1** ، **x2** ، **x3**] في المربع الذي بعنوان **Fixed Factor(s)**:
- ثم أنقر فوق الاختيار **Model**، لفتح المربع الحواري التالي:



في هذا المربع الحواري: قم بتنفيذ ما يلي:

- أ . اختر Full factorial بدلا من Custom.
- ب . قم بنقل المتغيرات [x1 ، x2 ، x3] من المربع الذي بعنوان Model إلى المربع الذي بعنوان Factors & Covariates.
- ج . ثم اختر Interaction بدلا من Main effects.
- د . ثم اضغط Continue ، للعودة للمربع الحواري السابق.

(2) ثم اضغط ok ، سنحصل على النتائج التالية :

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: y

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	133.667 ^a	3	44.556	3.999	.022
Intercept	2053.500	1	2053.500	184.308	.000
x1	10.667	1	10.667	.957	.340
x2	121.500	1	121.500	10.905	.004
x3	1.500	1	1.500	.135	.718
Error	222.833	20	11.142		
Total	2410.000	24			
Corrected Total	356.500	23			

a. R Squared = .375 (Adjusted R Squared = .281)

من الجدول الذي أمامك، نقوم بإعداد الجدول التالي:

P.Value	قيمة (ف) المحسوبة	متوسط الربعات	درجات الحرية	مجموع الربعات	مصدر البيان
0.340	0.957	10.667	1	10.667	المتغير الأول (نوع الملكية)
0.004	10.905	121.500	1	121.500	المتغير الثاني الجنس (النوع)
0.718	0.135	1.500	1	1.500	المتغير الثالث (المواظبة على الحضور)
*	*	11.142	20	222.833	الخطأ
*	*	*	23	356.500	الإجمالي

التعليق:

يتضح من الجدول السابق :

أ . عدم معنوية تأثير عامل نوع الملكية حيث أن P.Value تساوي

0.340 وهي أكبر من مستوى المعنوية 0.05 ، إذا القرار هو قبول

الفرض العدلي.

ب . و معنوية تأثير عامل الجنس (النوع) حيث أن P.Value تساوى 0.004 وهي أقل من مستوى المعنوية 0.05 ، إذا القرار هو رفض الفرض العددي و قبول الفرض البديل .

ج . أما تأثير عامل المراقبة على الحضور فكان غير معنواً حيث أن P.Value تساوى 0.718 وهي أكبر من مستوى المعنوية 0.05 ، إذا القرار هو قبول الفرض العددي .

الحالة الثانية : في حالة الاخذ في الاعتبار التفاعل (أو التأثير المتبادل) بين المتغيرات المستقلة .

مثال عملي :

في المثال السابق : المطلوب إظهار تأثير التفاعلات المتبادلة بين المتغيرات المستقلة
الثلاثة :

الخطوات :

نتبع نفس الخطوات السابقة ، فيما عدا أنه سيتم اختيار الأمر Full factorial بدلاً من الأمر Custom ، هنا سنحصل على النتائج التالية :

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: y

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	177.167 ^a	7	25.310	2.258	.084
Intercept	2053.500	1	2053.500	183.212	.000
x1	10.667	1	10.667	.952	.344
x2	121.500	1	121.500	10.840	.005
x3	1.500	1	1.500	.134	.719
x1 * x2	16.667	1	16.667	1.487	.240
x1 * x3	.667	1	.667	.059	.810
x2 * x3	20.167	1	20.167	1.799	.199
x1 * x2 * x3	6.000	1	6.000	.535	.475
Error	179.333	16	11.208		
Total	2410.000	24			
Corrected Total	356.500	23			

a. R Squared = .497 (Adjusted R Squared = .277)

يلاحظ هنا: عدم معنوية كل الحالات المختلفة للتأثيرات المتبادلة بين المتغيرات المستقلة، حيث أن جميع قيم P.Value كانت أكبر من مستوى المعنوية (0.05).

مصدر الاختلاف:

في حالة معنوية الفروق بين الحالات المختلفة لواحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة⁽¹⁾، فإنه يمكننا تحديد مصدر الاختلاف من خلال اختبارات المقارنات الثنائية (تماماً كما فعلنا في تحليل التباين الأحادي في اتجاه واحد).

الفصل الثالث

تحليل التباين المتعدد

Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)

الفصل الثالث

تحليل التباين المتعدد

Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)

مقدمة:

كما سبق وأن أوضحنا في الفصل الأول أنه في حالة تحليل التباين المتعدد MANOVA تكون بصدق أكثر من متغير تابع، وواحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة.

إذا الأصل في تحليل التباين المتعدد وهو وجود أكثر من متغير تابع. ثم بناء على عدد المتغيرات المستقلة يتحدد هل هو في اتجاه واحد أو في اتجاهين أو في "n" اتجاه حسب عدد المتغيرات المستقلة تماما كما فعلنا في تحليل التباين الأحادي.

و مراعاة للاختصار سوف نكتفي بمثال واحد يشرح تحليل التباين المتعدد في اتجاهين Two-Way MANOVA، بحيث يستطيع القارئ أن يقوم بنفسه بتنفيذ النوعين

الباقيين وهما:

- One-Way MANOVA
- N-Way MANOVA

مثال: بفرض أننا نريد دراسة مدى تأثير كل من نوع الجامعة و الجنس(النوع) كمتغيرات مستقلة، على أداء الطلاب في 3 مواد دراسية وهي الإحصاء والاقتصاد والمحاسبة (ملحوظة: درجات الطلاب في المواد الثلاثة تمثل المتغيرات التابعة).

وهنا يمكن تلخيص متغيرات النموذج كما يلي :

- | | |
|-------------------------------|-------|
| نوع الجامعة | X_1 |
| الجنس (النوع) | X_2 |
| درجات الطلاب في مادة الإحصاء | Y_1 |
| درجات الطلاب في مادة الاقتصاد | Y_2 |
| درجات الطلاب في مادة المحاسبة | Y_3 |

جامعة أسيوط						جامعة القاهرة					
طلاب			طلاب			طلاب			طلاب		
الجنس	الجنس	الجنس	الجنس	الجنس	الجنس	الجنس	الجنس	الجنس	الجنس	الجنس	الجنس
7.1	9.2	8.4	6.7	9.1	2.8	6.9	9.1	5.7	6.5	9.5	4.4
7	8.8	5.2	6.6	9.3	4.1	7.2	10	2	6.2	9.9	6.4
7.2	9.7	6.9	7.2	8.3	3.8	6.9	9.9	3.9	5.8	9.6	3
7.5	10.1	2.7	7.1	8.4	1.6	6.1	9.5	1.9	6.5	9.6	4.1
7.6	9.2	1.9	6.8	8.5	3.4	6.3	9.4	5.7	6.5	9.2	0.8

المطلوب:

دراسة مدى تأثير نوع الجامعة والجنس (النوع) على الاختلاف في درجات الطلاب في مواد الإحصاء والاقتصاد والمحاسبة عند مستوى معنوية 5٪ ، وذلك في حالة :

1. عدم الأخذ في الاعتبار التفاعل (أو التأثير المتبادل) بين المتغيرات المستقلة.

2. الأخذ في الاعتبار التفاعل (أو التأثير المتبادل) بين المتغيرات المستقلة.

الحالة الأولى: في حالة تجاهل أو عدم الأخذ في الاعتبار التفاعل (أو التأثير المتبادل) بين المتغيرات المستقلة :

الفرضيات الإحصائية :

المجموعة الأولى: تضم الفروض الخاصة بالعلاقة بين المتغيرات المستقلة (X_1) و (X_2) وبين

المتغير التابع الأول (Y_1) :

1. تأثير المتغير المستقل الأول (X_1) على المتغير التابع (Y_1) :

الفرض العددي (H_0): تأثير نوع الجامعة على متوسط أداء الطلاب في مادة الإحصاء غير معنوي.

الفرض البديل (H_1): تأثير نوع الجامعة على متوسط أداء الطلاب في مادة الإحصاء معنوي.

2. تأثير المتغير المستقل الثاني (X_2) على المتغير التابع (Y_1) :

الفرض العددي (H_0): تأثير الجنس (النوع) على متوسط أداء الطلاب في مادة الإحصاء غير معنوي.

الفرض البديل (H_1): تأثير الجنس (النوع) على متوسط أداء الطلاب في مادة الإحصاء معنوي.

المجموعة الثانية: تضم الفروض الخاصة بالعلاقة بين المتغيرات المستقلة (X_1) و (X_2) وبين

المتغير التابع الثاني (Y_2) :

١. تأثير المتغير المستقل الأول (X_1) على المتغير التابع (y_2):

الفرض العدمي (H₀): تأثير نوع الجامعة على متوسط أداء الطلاب في مادة الاقتصاد غير معنوي.

الفرض البديل(H₁): تأثير نوع الجامعة على متوسط أداء الطلاب في مادة الاقتصاد معنوي.

٢. تأثير المتغير المستقل الثاني (X_2) على المتغير التابع (y_2):

الفرض العدمي (H₀): تأثير الجنس (النوع) على متوسط أداء الطلاب في مادة الاقتصاد غير معنوي.

الفرض البديل(H₁): تأثير الجنس (النوع) على متوسط أداء الطلاب في مادة الاقتصاد معنوي.

المجموعة الثالثة: تضم الفروض الخاصة بالعلاقة بين المتغيرات المستقلة [X_1] و [X_2] وبين

المتغير التابع الثالث (y_3):

١. تأثير المتغير المستقل الأول (X_1) على المتغير الثالث (y_3):

الفرض العدمي (H₀): تأثير نوع الجامعة على متوسط أداء الطلاب في مادة المحاسبة غير معنوي.

الفرض البديل(H₁): تأثير نوع الجامعة على متوسط أداء الطلاب في مادة المحاسبة معنوي.

٢. تأثير المتغير المستقل الثاني (X_2) على المتغير التابع (y_3):

الفرض العدمي (H₀): تأثير الجنس (النوع) على متوسط أداء الطلاب في مادة المحاسبة غير معنوي.

الفرض البديل(H₁): تأثير الجنس (النوع) جامعه على متوسط أداء الطلاب في مادة المحاسبة معنوي.


الخطوات:

إدخال البيانات: (1)

	y1	y2	y3	x1	x2	va
1	6.50	9.50	4.40	1.00	1.00	
2	6.20	9.90	6.40	1.00	1.00	
3	5.80	9.60	3.00	1.00	1.00	
4	6.50	9.60	4.10	1.00	1.00	
5	6.50	9.20	.80	1.00	1.00	
6	6.90	9.10	5.70	1.00	2.00	
7	7.20	10.00	2.00	1.00	2.00	
8	6.90	9.90	3.90	1.00	2.00	
9	6.10	9.50	1.90	1.00	2.00	
10	6.30	9.40	5.70	1.00	2.00	
11	6.70	9.10	2.80	2.00	1.00	
12	6.60	9.30	4.10	2.00	1.00	
13	7.20	8.30	3.80	2.00	1.00	
14	7.10	8.40	1.60	2.00	1.00	
15	6.80	8.50	3.40	2.00	1.00	
16	7.10	9.20	8.40	2.00	2.00	
17	7.00	8.80	5.20	2.00	2.00	
18	7.20	9.70	6.90	2.00	2.00	
19	7.50	10.10	2.70	2.00	2.00	
20	7.60	9.20	1.90	2.00	2.00	
21						

افتح قائمة Analyze ، ومن القائمة الفرعية لـ Linear Model GLM (2)

اختر الأمر .. Multivariate ، سوف يظهر لك المربع الحواري التالي:



في المربع الحواري الذي أمامك:


أ . أدخل المتغيرات التابعة (y3, y2, y1) في المربع الذي بعنوان

. Dependent Variables:

ب . ثم قم بإدخال المتغيرات المستقلة [x1 ، x2] في المربع الذي بعنوان

. Fixed Factor(s):

ج . ثم أنقر فوق الاختيار Model، لفتح المربع الحواري التالي:



في هذا المربع الحواري: قم بتنفيذ ما يلي:

أ. اختر **Full factorial** بدلا من **Custom**.

ب. قم بنقل المتغيرات **X1** ، **X2** [من المربع الذي بعنوان **Factors**

. **Model & Covariates** إلى المربع الذي بعنوان **Model**

ج. ثم اختر **Main effects** بدلا من **Interaction**.

د. ثم اضغط **Continue**، للعودة للمربع الحواري السابق.

ثم اضغط **ok** ، سنحصل على النتائج التالية : (3)

تضمن صفحة المخرجات نوعين من الجداول:

الجدول الأول: بعنوان **Multivariate Tests**: كما هو موضح بالشكل التالي:

Multivariate Tests^b

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	.999	5518.797 ^a	3.000	15.000	.000
	Wilks' Lambda	.001	5518.797 ^a	3.000	15.000	.000
	Hotelling's Trace	1103.759	5518.797 ^a	3.000	15.000	.000
	Roy's Largest Root	1103.759	5518.797 ^a	3.000	15.000	.000
x1	Pillai's Trace	.613	7.925 ^a	3.000	15.000	.002
	Wilks' Lambda	.387	7.925 ^a	3.000	15.000	.002
	Hotelling's Trace	1.585	7.925 ^a	3.000	15.000	.002
	Roy's Largest Root	1.585	7.925 ^a	3.000	15.000	.002
x2	Pillai's Trace	.446	4.028 ^a	3.000	15.000	.028
	Wilks' Lambda	.554	4.028 ^a	3.000	15.000	.028
	Hotelling's Trace	.806	4.028 ^a	3.000	15.000	.028
	Roy's Largest Root	.806	4.028 ^a	3.000	15.000	.028

a. Exact statistic

b. Design: Intercept+x1+x2

يتضمن هذا الجدول نتائج (4) اختبارات مختلفة لاختبار المعنوية الكلية للنموذج بالنسبة لكل متغير من المتغيرات المستقلة. بحيث أنه في حالة الدلالة المعنوية لأي متغير من المتغيرات المستقلة فهذا يعني أن هذا المتغير المستقل لابد وأن يكون له تأثير معنوي على الاختلاف في واحد أو أكثر من المتغيرات التابعية.

والاختبارات الأربع التي يشملها هذا الجدول هي :

1. اختبار Pillai's Trace

2. اختبار Wilks' Lambda

3. اختبار Hotelling' s Trace

4. اختبار Roy's Largest Root

وهنا يمكننا أن نكتفي بنتائج أحد هذه الاختبارات الأربع - ولتكن اختبار Wilks' Lambda (وهذا لا يعني إقرارنا بأفضلية هذا الاختبار مقارنة بباقي الاختبارات ، بل

يتعين على القارئ الرجوع إلى المراجع الإحصائية أو الدراسات التي اهتمت بالمقارنة بين هذه الاختبارات الأربع).

P.Value	F المحسوبة	إحصائي اختبار Wilks' Lambda	المتغيرات المستقلة
0.002	7.925	0.387	X1
0.028	4.028	0.554	X2

التعليق:

من البيانات الموجودة في هذا الجدول: نجد أن قيمة P.Value أقل من مستوى المعنوية (0.05) لجميع المتغيرات المستقلة (X_1 , X_2). وبالتالي من المتوقع أن يكون لكل من هذين المتغيرين تأثير معنوي على واحد أو أكثر من المتغيرات التابعية، ومن خلال النتائج التي سيوضحها جدول تحليل التباين القالي (الجدول الثاني) سيتم تحديد أيًا من هذه المتغيرات التابعية التي تتأثر بهذين المتغيرين المستقلين.

الجدول الثاني: بعنوان Tests of Between-Subjects Effects : من خلال هذا الجدول يتم دراسة المعنوية الجزئية لكل متغير مستقل، بحيث يمكن الحكم أو اتخاذ القرار بشأن الفروض الأساسية في النموذج.

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	y1	2.501 ^a	2	1.250	12.048	.001
	y2	1.913 ^b	2	.956	5.125	.018
	y3	5.321 ^c	2	2.661	.657	.531
Intercept	y1	920.724	1	920.724	8870.681	.000
	y2	1735.384	1	1735.384	9299.145	.000
	y3	309.684	1	309.684	76.427	.000
x1	y1	1.740	1	1.740	16.769	.001
	y2	1.301	1	1.301	6.969	.017
	y3	.421	1	.421	.104	.751
x2	y1	.760	1	.760	7.327	.015
	y2	.612	1	.612	3.282	.088
	y3	4.900	1	4.900	1.209	.287
Error	y1	1.765	17	.104		
	y2	3.172	17	.187		
	y3	68.885	17	4.052		
Total	y1	924.990	20			
	y2	1740.470	20			
	y3	383.890	20			
Corrected Total	y1	4.265	19			
	y2	5.085	19			
	y3	74.206	19			

a. R Squared = .586 (Adjusted R Squared = .538)

b. R Squared = .376 (Adjusted R Squared = .303)

c. R Squared = .072 (Adjusted R Squared = -.038)

من خلال البيانات الواردة في هذا الجدول يتم تكوين الجداول التالية:

١. جدول تحليل التباين لتأثير (x_1 , x_2) على المتغير التابع الأول (y_1).

P.Value	قيمة (F) المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
0.001	16.769	1.740	1	1.740	المتغير المستقل الأول (x_1)
0.015	7.327	0.760	1	0.760	المتغير المستقل الثاني (x_2)
**	**	0.104	17	1.765	الخطأ
**	**	**	19	4.265	الإجمالي

التعليق:

يلاحظ من جدول تحليل التباين:

أ. معنوية تأثير المتغير المستقل الأول (X_1) على المتغير التابع (y_1) حيث أن P.Value تساوى 0.001 وهي أقل من مستوى المعنوية 5%. وهذا يعني أن نوع الجامعة يؤثر على أداء الطلاب (متوسط الدرجات) في مادة الإحصاء.

ب. كذلك المتغير المستقل الثاني (X_2) له تأثير معنوي على المتغير التابع (y_1) حيث أن P.Value تساوى 0.015 وهي أقل من مستوى المعنوية 5%.

2. جدول تحليل التباين لتأثير (X_1, X_2) على المتغير التابع الثاني (y_2):

P.Value	قيمة (F) المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
0.017	6.969	1.301	1	1.301	المتغير المستقل الأول (X_1)
0.088	3.282	0.612	1	0.612	المتغير المستقل الثاني (X_2)
**	**	0.187	17	3.172	الخطأ
**	**	**	19	5.085	الإجمالي

التعليق:

يلاحظ من جدول تحليل التباين:

أ. معنوية تأثير المتغير المستقل الأول (X_1) على المتغير التابع (y_2) حيث أن P.Value تساوى 0.017 وهي أقل من مستوى المعنوية 5%.

ب. عدم معنوية تأثير المتغير المستقل الثاني (X_2) على المتغير التابع (y_2) حيث أن P.Value تساوى 0.088 وهي أكبر من مستوى المعنوية 5%.

3. جدول تحليل التباين لتأثير (X_1, X_2) على المتغير التابع الثالث (y_3):

P.Value	قيمة (F) المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
0.751	0.104	0.421	1	0.421	المتغير المستقل الأول (X_1)
0.287	1.209	4.900	1	4.900	المتغير المستقل الثاني (X_2)
**	**	4.052	17	68.885	الخطأ
**	**	**	19	74.206	الإجمالي

التعليق:

يلاحظ من جدول تحليل التباين:

أ. عدم معنوية تأثير المتغير المستقل الأول (X_1) على المتغير التابع (y_3) حيث أن P.Value تساوى 0.751 وهي أكبر من مستوى المعنوية 5%.

بـ. كذلك عدم معنوية تأثير المتغير المستقل الثاني (X_2) على المتغير التابع (y_3) حيث أن P.Value تساوى 0.287 وهي أكبر من مستوى المعنوية 5%.

الحالة الثانية: في حالة الأخذ في الاعتبار التفاعل (أو التأثير المتبادل) بين المتغيرات المستقلة:

الفرضيات الإحصائية:

بالإضافة إلى الفرضيات السابقة، يضاف الفرض الخاصة بالتأثير المتبادل للمتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعية، كما يلي:

١. تأثير التفاعل أو التأثير المتبادل على المتغير التابع (y_1):

الفرض العددي (H_0): تأثير التفاعل المتبادل بين المتغيرات المستقلة (X_1 , X_2) على متوسط أداء الطلاب في مادة الإحصاء غير معنوي.

الفرض البديل (H_1): تأثير التفاعل المتبادل بين المتغيرات المستقلة (X_1 , X_2) على متوسط أداء الطلاب في مادة الإحصاء معنوي.

٢. تأثير التفاعل أو التأثير المتبادل على المتغير التابع (y_2):

الفرض العددي (H_0): تأثير التفاعل المتبادل بين المتغيرات المستقلة (X_1 , X_2) على متوسط أداء الطلاب في مادة الاقتصاد غير معنوي.

الفرض البديل (H_1): تأثير التفاعل المتبادل بين المتغيرات المستقلة (X_1 , X_2) على متوسط أداء الطلاب في مادة الاقتصاد معنوي.

3. تأثير التفاعل أو التأثير المتبادل على المتغير التابع (y_3):

الفرض العددي (H₀): تأثير التفاعل المتبادل بين المتغيرات المستقلة (X_1 , X_2) على متوسط أداء الطلاب في مادة المحاسبة غير معنوي.

الفرض البديل (H₁): تأثير التفاعل المتبادل بين المتغيرات المستقلة (X_1 , X_2) على متوسط أداء الطلاب في مادة المحاسبة معنوي.

ملحوظة هامة:


لو كان عدد المتغيرات المستقلة ثلاثة، في هذه الحالة كنا سنبحث تأثير التفاعل المتبادل لكل من:

- . التفاعل أو التأثير المتبادل بين X_1 و X_2 .
- . التفاعل أو التأثير المتبادل بين X_1 و X_3 .
- . التفاعل أو التأثير المتبادل بين X_2 و X_3 .
- . التفاعل أو التأثير المتبادل بين X_1 و X_2 و X_3 .

الخطوات:

Multivariate: تتبع نفس الخطوات السابقة فيما عدا انه في المربع الحواري سوف نختار الأمر Full factorial بدلا من الأمر Custom، كما هو موضح بالشكل التالي:

تحليل التباين المتعدد



ثم اضغط **Continue**، للعودة للمرجع الحواري الأساسي. ثم اضغط **ok**، سنحصل على النتائج التالية :

Multivariate Tests ^b						
Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	.999	5950.906 ^a	3.000	14.000	.000
	Wilks' Lambda	.001	5950.906 ^a	3.000	14.000	.000
	Hotelling's Trace	1275.194	5950.906 ^a	3.000	14.000	.000
	Roy's Largest Root	1275.194	5950.906 ^a	3.000	14.000	.000
x1	Pillai's Trace	.618	7.554 ^a	3.000	14.000	.003
	Wilks' Lambda	.382	7.554 ^a	3.000	14.000	.003
	Hotelling's Trace	1.619	7.554 ^a	3.000	14.000	.003
	Roy's Largest Root	1.619	7.554 ^a	3.000	14.000	.003
x2	Pillai's Trace	.477	4.256 ^a	3.000	14.000	.025
	Wilks' Lambda	.523	4.256 ^a	3.000	14.000	.025
	Hotelling's Trace	.912	4.256 ^a	3.000	14.000	.025
	Roy's Largest Root	.912	4.256 ^a	3.000	14.000	.025
x1 * x2	Pillai's Trace	.223	1.339 ^a	3.000	14.000	.302
	Wilks' Lambda	.777	1.339 ^a	3.000	14.000	.302
	Hotelling's Trace	.287	1.339 ^a	3.000	14.000	.302
	Roy's Largest Root	.287	1.339 ^a	3.000	14.000	.302

a. Exact statistic

b. Design: Intercept+x1+x2+x1 * x2

تفيير النتائج:

نتائج اختبار
Wilks' Lambda

P.Value	ف المحسوبة	إحصائي اختبار Wilks' Lambda	المتغيرات المستقلة
0.003	7.554	0.382	X1
0.025	4.256	0.523	X2
0.302	1.339	0.777	التأثير المتبادل X ₁ *X ₂

التعليق:

من البيانات الموجودة في هذا الجدول: نجد أن قيمة P.Value أقل من مستوى المعنوية (0.05) للمتغيرات المستقلة (X₁, X₂). وبالتالي من المتوقع أن يكون لكل من هذين المتغيرين تأثير معنوي على واحد أو أكثر من المتغيرات التابعه. في حين أن التأثير المتبادل كان غير معنويا حيث أن قيمة P.Value أكبر من مستوى المعنوية (0.05).

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	Y1	2.501 ^a	3	.834	7.563	.002
	Y2	2.457 ^b	3	.819	4.987	.012
	Y3	9.282 ^c	3	3.094	.762	.531
Intercept	Y1	920.724	1	920.724	8351.243	.000
	Y2	1735.384	1	1735.384	10565.507	.000
	Y3	309.684	1	309.684	76.319	.000
X1	Y1	1.741	1	1.740	15.787	.001
	Y2	1.301	1	1.301	.7918	.012
	Y3	.421	1	.421	.104	.752
X2	Y1	.761	1	.760	.6898	.018
	Y2	.612	1	.612	3.729	.071
	Y3	4.900	1	4.900	1.208	.288
X1 * X2	Y1	5.000E-04	1	5.000E-04	.005	.947
	Y2	.544	1	.544	3.315	.087
	Y3	3.960	1	3.960	.976	.338
Error	Y1	1.764	16	.110		
	Y2	2.628	16	.164		
	Y3	64.924	16	4.058		
Total	Y1	924.990	20			
	Y2	1740.470	20			
	Y3	383.890	20			
Corrected Total	Y1	4.265	19			
	Y2	5.085	19			
	Y3	74.206	19			

a. R Squared = .586 (Adjusted R Squared = .509)

b. R Squared = .483 (Adjusted R Squared = .386)

c. R Squared = .125 (Adjusted R Squared = -.039)

من خلال البيانات الواردة في هذا الجدول سوف يتم تكوين نفس جداول تحليل التباين

الثلاثة السابقة، مع إضافة مصدر التباين الخاص بالتأثير المتبادل للمتغيرات المستقلة في

كل جدول كما يلي:

4. جدول تحليل التباين لتأثير (X_1, X_2) على المتغير التابع الأول (y_1).

ملحوظة هامة :

سوف تجد هناك اختلاف بين القيم الموجودة في جدول تحليل التباين الذي أعددناه والقيم المقابلة لها في جدول المخرجات، والسبب في ذلك يرجع إلى عمليات التقرير. ويمكنك معرفة القيم الأصلية بدون تقرير من خلال النقر المزدوج فوق أي رقم من الأرقام الموجودة في صفحة المخرجات.

P.Value	قيمة (F) المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
0.001	15.787	1.7405	1	1.7405	المتغير المستقل الأول (X_1)
0.018	6.898	0.7605	1	0.7605	المتغير المستقل الثاني (X_2)
0.947	0.005	0.0005	1	0.0005	التأثير المتبادل بين (X_2, X_1)
**	**	0.11025	16	1.764	الخطأ
**	**	**	17	4.2655	الإجمالي

التعليق: يلاحظ من جدول تحليل التباين:

أ. معنوية تأثير كل من المتغير المستقل الأول (X_1) والمتغير المستقل الثاني (X_2)

على المتغير التابع (y_1) حيث أن P.Value في الحالتين أقل من مستوى المعنوية

5%. وهذا يعني أن نوع الجامعة والجنس (النوع) يؤثران على أداء الطلاب

(متوسط الدرجات) في مادة الإحصاء.

ب. كذلك يوضح الجدول السابق –أيضاً– عدم معنوية التفاعل أو التأثير المتبادل بين

X_1, X_2 على المتغير التابع (y_1) حيث أن P.Value تساوى 0.947 وهي أكبر

من مستوى المعنوية 5%.

5. جدول تحليل التباين لتأثير X_1, X_2 على المتغير التابع الثاني (y_2):

P.Value	قيمة (F) المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
0.012	7.918	1.3005	1	1.3005	المتغير المستقل الأول (X_1)
0.071	3.729	0.6125	1	0.6125	المتغير المستقل الثاني (X_2)
0.087	3.315	0.5445	1	0.5445	التأثير المتبادل بين (X_2, X_1)
**	**	0.16425	16	2.628	الخطأ
**	**	**	19	5.0855	الإجمالي

التعليق:

يلاحظ من جدول تحليل التباين:

أ. معنوية تأثير المتغير المستقل الأول (X_1) على المتغير التابع (y_1) حيث أن P.Value في الحالتين أقل من مستوى المعنوية 5%. وهذا يعني أن نوع الجامعة يؤثر على أداء الطلاب (متوسط الدرجات) في مادة الاقتصاد.

ب. كذلك يوضح الجدول السابق –أيضاً– عدم معنوية كل من والمتغير المستقل الثاني (X_2) التفاعل أو التأثير المتبادل بين (X_1, X_2) على المتغير التابع (y_1) حيث أن P.Value في الحالتين كانت أكبر من مستوى المعنوية 5%.

6. جدول تحليل التباين لتأثير (X_1, X_2 , X_3) على المتغير التابع الثالث (y_3):

P.Value	قيمة (F) المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
0.752	0.1036	0.4205	1	0.4205	المتغير المستقل الأول (X_1)
0.288	1.2077	4.9005	1	4.9005	المتغير المستقل الثاني (X_2)
0.338	0.9760	3.9605	1	3.9605	التأثير المتبادل بين (X_2, X_1)
**	**	4.05775	16	64.924	الخطأ
**	**	**	19	74.2055	الإجمالي

التعليق:

يلاحظ من جدول تحليل التباين:

عدم معنوية تأثير كل المتغيرات سواء المتغير المستقل الأول (X_1) أو المتغير المستقل الثاني (X_2) أو التأثير المتبادل بين المتغيرات المستقلة (X_1, X_2) على المتغير التابع الثالث (y_3), حيث أن قيمة P.Value في الحالات الثلاثة كانت أكبر من مستوى المعنوية 5%.

غنى عن البيان أنه: في حالة وجود متغير واحد مستقل لن يكون هناك وجود لما يسمى بالتأثير المتبادل.

الفصل الرابع

تحليل التغير الاحادي
Analysis of Covariance
(ANCOVA)

الفصل الرابع
تحليل التغير الأحادي
Analysis of Covariance
(ANCOVA)

مقدمة :

كما سبق وأن أشرنا، أن تحليل التغير الأحادي ANCOVA هو نفسه تحليل التباين الأحادي ANOVA (سواء في اتجاه واحد أو اثنين أو أكثر). أي أننا ندرس العلاقة بين متغير واحد تابع، واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة ولكن مع اختلاف واحد وهو أنه في تحليل ANCOVA يتم استبعاد أثر متغير ما (أو أكثر) من المتغيرات ذات العلاقة مع المتغير التابع⁽¹⁾.

مثال عملي:

باستخدام البيانات الواردة في الجدول الموجود في الصفحة التالية، المطلوب: المقارنة بين أداء الطلاب في الجامعات الثلاثة في مادة الرياضيات، بعد استبعاد أثر متغير الذكاء، وذلك عند مستوى معنوية 5%.

¹ يسمى هذه المتغير بالمتغير الحاكم Control Variable، وأحياناً يسمى بـ Covariates

جامعة الإسكندرية		جامعة جنوب الوادي		جامعة القاهرة	
درجات مادة الرياضيات (Y)	مستوى الذكاء (x)	درجات مادة الرياضيات (Y)	مستوى الذكاء (x)	درجات مادة الرياضيات (Y)	مستوى الذكاء (x)
3	0.66	12	0.75	15	0.70
6	0.25	18	0.82	11	0.65
18	0.79	5	0.40	8	0.50
20	0.94	14	0.65	16	0.60
14	0.74	*	*	15	0.55
*	*	*	*	18	0.90

الفرض الإحصائي:

الفرض العددي: لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين مستوى أداء الطلاب في مادة الرياضيات في الجامعات الثلاثة بعد استبعاد أثر مستوى الذكاء.

الفرض البديل: توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين مستوى أداء الطلاب في مادة الرياضيات في الجامعات الثلاثة بعد استبعاد أثر مستوى الذكاء.


إدخال البيانات:

	y	treatment	x	var
1	15.00	1.00	.70	
2	11.00	1.00	.65	
3	8.00	1.00	.50	
4	16.00	1.00	.60	
5	15.00	1.00	.55	
6	18.00	1.00	.90	
7	12.00	2.00	.75	
8	18.00	2.00	.82	
9	5.00	2.00	.40	
10	14.00	2.00	.65	
11	3.00	3.00	.66	
12	6.00	3.00	.25	
13	18.00	3.00	.79	
14	20.00	3.00	.94	
15	14.00	3.00	.74	
16				
17				

خطوات تنفيذ الاختبار

افتح قائمة **GLM Linear Model** ، ومن القائمة الفرعية لـ **Analyze** (1)

اختر .. **Univariate** ، سوف يظهر لك المربع الحواري التالي:



في المربع الحواري الذي أمامك:

- أدخل المتغير التابع [y] في المربع الذي بعنوان **Dependent Variable:**
- ثم قم بإدخال المتغير المستقل Treatment في المربع الذي بعنوان **Fixed Factor(s):**
- ثم أدخل المتغير [x] في المربع الذي بعنوان **Covariate(s):**
- ثم اضغط Ok، سنحصل على النتائج التالية: (2)

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: y

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	228.156 ^a	3	76.052	5.309	.017
Intercept	2.225	1	2.225	.155	.701
x	218.806	1	218.806	15.274	.002
treatment	14.503	2	7.251	.506	.616
Error	157.578	11	14.325		
Total	2869.000	15			
Corrected Total	385.733	14			

a. R Squared = .591 (Adjusted R Squared = .480)

من الجدول الذي أمامك، نقوم بإعداد الجدول التالي :

P.Value	قيمة (ف) المحسوبة	متوسط الربعات	درجات الحرية	مجموع الربعات	مصدر البيان
0.616	0.506	7.521	2	14.503	المعالجات
*	*	14.325	11	157.578	الخطأ
*	*	*	13	172.081	الإجمالي

التعليق:

يتضح من الجدول السابق: عدم معنوية الفروق بين أداء الطلاب في الجامعات الثلاثة في مادة الرياضيات وبعد استبعاد أثر مستوى الذكاء بين الطلاب حيث أن P.Value تساوي 0.616 وهي أكبر من مستوى المعنوية 0.05 ، إذا القرار هو قبول الفرض العددي.

ملحوظة:

المثال الذي كنا بصدده الآن قد تناول تحليل التغاير الأحادي في اتجاه واحد One-Way ANCOVA حيث كان لدينا متغير واحد مستقل. و بإتباع نفس الأسلوب والخطوات يستطيع القارئ أن يقوم بنفسه بتنفيذ باقي الحالات الأخرى لتحليل التغاير الأحادي وهما :

- Two-Way ANCOVA
- N-Way ANCOVA

الفصل الخامس

تحليل التغاير المتعدد Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA)

الفصل الخامس

تحليل التغير المتعدد

Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA)

مقدمة:

تحليل التغير المتعدد MANCOVA هو نفسه تحليل التباين المتعدد (ANOVA) سواء في اتجاه واحد أو اثنين أو أكثر من اثنين)، ولكن مع اختلاف واحد وهو أنه في تحليل MANCOVA يتم استبعاد أثر متغير ما (أو أكثر) من المتغيرات ذات العلاقة مع المتغيرات التابعه¹.

مثال:

من البيانات الواردة في الجدول التالي، المطلوب: دراسة مدى تأثير نوع ملكية الجامعة على مستوى أداء الطلاب في مادتي المحاسبة والإحصاء بفرض استبعاد أثر متوسط عدد الساعات اليومية التي يقضيها كل طالب في المذاكرة، وذلك عند مستوى معنوية 5%.

¹ يسمى هذه المتغير بالمتغير الحاكم Control Variable، وأحياناً يسمى بـ Covariates

الجامعات الخاصة			الجامعات الحكومية		
درجات مادة الإحصاء	درجات مادة المحاسبة	متوسط عدد ساعات المراجعة	درجات مادة الإحصاء	درجات مادة المحاسبة	متوسط عدد ساعات المذاكرة
16	11	3	13	15	5
12	13	4	7	18	6
5	17	2	16	10	4
7	6	1	14	11	7
3	2	4	18	7	6
11	7	3	6	14	4
14	4	2	15	6	2
8	17	2	14	4	4

الفرض الإحصائي:

1. تأثير المتغير المستقل (X_1) على المتغير التابع (y_1):

الفرض العددي (H_0): تأثير نوع ملكية الجامعة على متوسط أداء الطلاب في مادة المحاسبة غير معنوي.

الفرض البديل (H₁): تأثير نوع الجامعة على متوسط أداء الطلاب في مادة المحاسبة معنوي.

2. تأثير المتغير المستقل (X₁) على المتغير التابع (Y₂):

الفرض العددي (H₀): تأثير نوع ملكية الجامعة على متوسط أداء الطلاب في مادة الإحصاء غير معنوي.

الفرض البديل (H₁): تأثير نوع ملكية الجامعة على متوسط أداء الطلاب في مادة الإحصاء معنوي.

ادخال البيانات:


The screenshot shows the SPSS Data Editor window titled "Untitled - SPSS Data Editor". The menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, and Help. The toolbar contains various icons for data manipulation. The data view shows a table with 18 rows and 5 columns. The columns are labeled y1, y2, x1, cov1, and var. The first few rows of data are as follows:

	y1	y2	x1	cov1	var
1	15.00	13.00	1.00	5.00	
2	18.00	7.00	1.00	6.00	
3	10.00	16.00	1.00	4.00	
4	11.00	14.00	1.00	7.00	
5	7.00	18.00	1.00	6.00	
6	14.00	6.00	1.00	4.00	
7	6.00	15.00	1.00	2.00	
8	4.00	14.00	1.00	4.00	
9	11.00	16.00	2.00	3.00	
10	13.00	12.00	2.00	4.00	
11	17.00	5.00	2.00	2.00	
12	6.00	7.00	2.00	1.00	
13	2.00	3.00	2.00	4.00	
14	7.00	11.00	2.00	3.00	
15	4.00	14.00	2.00	2.00	
16	17.00	8.00	2.00	2.00	
17					
18					

خطوات تنفيذ الاختبار:

افتح قائمة **Analyze** ، ومن القائمة الفرعية لـ **Linear Model GLM** (1)

اختر الأمر .. **Multivariate** ، سوف يظهر لك المربع الحواري التالي:



في المربع الحواري الذي أمامك:

قم بنقل المتغيرات التابعه ($y1$, $y2$) إلى المربع الذي بعنوان

. **Dependent Variables:**

ثم قم بنقل المتغير المستقل [$x1$] إلى المربع الذي بعنوان **Fixed Factor(s):**

ثم أنقل المتغير $cov1$ إلى المربع الذي بعنوان **Covariate(s):**

ثم اضغط **ok** ، سنحصل على النتائج التالية : (2)

MANCOVA تحليل التباين المتعدد

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	Y1	14.247 ^a	2	7.123	.240	.790
	Y2	45.565 ^b	2	22.782	1.110	.359
Intercept	Y1	101.200	1	101.200	3.413	.088
	Y2	207.813	1	207.813	10.123	.007
COV1	Y1	10.247	1	10.247	.346	.567
	Y2	2.463E-03	1	2.463E-03	.000	.991
X1	Y1	.287	1	.287	.010	.923
	Y2	26.287	1	26.287	1.281	.278
Error	Y1	385.503	13	29.654		
	Y2	266.873	13	20.529		
Total	Y1	2040.000	16			
	Y2	2315.000	16			
Corrected Total	Y1	399.750	15			
	Y2	312.437	15			

a. R Squared = .036 (Adjusted R Squared = -.113)

b. R Squared = .146 (Adjusted R Squared = .014)

يتضح من نتائج هذا الجدول عدم معنوية تأثير المتغير المستقل على المتغيرات التابعه
حيث أن قيمة P.Value في الحالتين كانت أكبر من مستوى المعنوية

.٪5

الفصل السادس

تحليل الارتباط

Correlation Analysis

الفصل السادس

تحليل الارتباط

Correlation Analysis

مقدمة:

يستخدم تحليل الارتباط في تقدير درجة الارتباط الخطي (مدى وجود علاقة خطية) بين متغيرين، واتجاه هذه العلاقة. وتتراوح قيمة معامل الارتباط بين (+)، (-)، والإشارة الموجبة (+) تعنى أن العلاقة طردية، أما الإشارة السالبة (-) فتعنى أن العلاقة عكسية بين المتغيرين.

بصفة عامة، يقدم برنامج SPSS ثلاثة مقاييس لمعامل الارتباط:

1. **معامل ارتباط بيرسون Pearson**: من المقاييس المعلمية التي يستخدم في حالة المتغيرات الكمية.

2. **معامل ارتباط سبيرمان للرتب Spearman's rho** : من المقاييس اللامعلمية التي تستخدم في حالة المقاييس الترتيبية.

3. **معامل كندال للرتب Kendall's tau**: كما هو الحال في معامل ارتباط سبيرمان.

اختبار معنوية معامل الارتباط:

١. في حالة الاختبار من طرفين:

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_1 : \rho \neq 0$$

ويمكن صياغة الفروض الإحصائية السابقة بشكل آخر كما يلي:

الفرض العددي (H_0): معامل الارتباط الخطى بين الدخل والاستهلاك غير معنوى.

الفرض البديل (H_1): معامل الارتباط الخطى بين الدخل والاستهلاك معنوى.

٢. في حالة الاختبار من طرف واحد:

أ. إذا كانت إشارة معامل الارتباط موجبة: فإن البرنامج يقوم باختبار الفروض التالية:

$$H_0 : \rho \leq 0$$

$$H_1 : \rho > 0$$

ب. أما إذا كانت إشارة معامل الارتباط سالبة: فإن البرنامج يقوم باختبار الفروض التالية:

$$H_0 : \rho \geq 0$$

$$H_1 : \rho < 0$$

مثال [١]: من البيانات المتوفرة في الجدول التالي:

المطلوب:

أ- حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل من الدخل والادخار.

بـ- اختبار معنوية معامل الارتباط:

- في حالة الاختبار من طرفين.
 - في حالة الاختبار من طرف واحد.
- وذلك عند مستوى معنوية 5 % .

الادخار	الدخل
15	100
10	120
30	150
40	180
45	200
20	210
80	190
50	400
100	250
60	350
90	600

إدخال البيانات:

يتم إدخال البيانات كما يلي :


	income	savings	var
1	100.00	15.00	
2	120.00	10.00	
3	150.00	30.00	
4	180.00	40.00	
5	200.00	45.00	
6	210.00	20.00	
7	190.00	80.00	
8	400.00	50.00	
9	250.00	100.00	
10	350.00	60.00	
11	600.00	90.00	
12			

الخطوات:

أولاً في حالة الاختبار من طرفين:

(1) افتح قائمة Analyze اختار Correlate بـ Bivariate

..، سوف يظهر لك المربع الحواري التالي:



في المربع الحواري الذي أمامك: قم بما يلي:

أ- انقل كل من (income, savings) إلى المربع الذي بعنوان

. Variables:

ب- أن الاختيار الافتراضي لمعامل الارتباط هو معامل ارتباط بيرسون

. (سنتركه كما هو). Pearson

ج- كما أن الاختيار الافتراضي لاختبار المعنوية هو الاختبار من طرفين Two-

. (أيضا سنتركه كما هو). tailed

(2) ثم اضغط Ok، سوف تظهر لك النافذة الخاصة بمخرجات هذا الاختبار.

Correlations

		INCOME	SAVINGS
INCOME	Pearson Correlation	1.000	.617*
	Sig. (2-tailed)	.	.043
	N	11	11
SAVINGS	Pearson Correlation	.617*	1.000
	Sig. (2-tailed)	.043	.
	N	11	11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

تغريغ النتائج والتعليق عليها:

p-value	معامل الارتباط
0.043	0.617

يتضح لنا من الجدول السابق: أن هناك ارتباط طردي بين الدخل والاستهلاك ($+0.617$). كما يلاحظ - أيضاً - أن قيمة P.Value تساوى 0.043 أي 4.3%， وهي أقل من مستوى المعنوية 5%， وبالتالي فإننا نرفض الفرض العدلي ونقبل الفرض البديل القائل بأن علاقة الارتباط بين المتغيرين (الدخل والاستهلاك) تختلف عن الصفر أي أن علاقة الارتباط معنوية.

ثانياً: في حالة الاختبار من طرف واحد


يلاحظ أن إشارة معامل الارتباط في هذا المثال موجبة، إذا الفروض الإحصائية في حالة الاختبار من طرف واحد ستكون على الشكل التالي:

$$H_0 : \rho \leq 0$$

$$H_1 : \rho > 0$$

الخطوات:

1) نتبع نفس الخطوات السابقة فيما عدا أنه يتم اختيار One – tailed بدلاً من Two – tailed كما هو موضح في المربع الحواري التالي:



(2) ثم نضغط Ok، سوف تظهر لك النافذة الخاصة بمخرجات هذا الاختبار.

Correlations

		INCOME	SAVINGS
INCOME	Pearson Correlation	1.000	.617*
	Sig. (1-tailed)	.	.021
	N	11	11
SAVINGS	Pearson Correlation	.617*	1.000
	Sig. (1-tailed)	.021	.
	N	11	11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

تغريغ النتائج والتعليق :

p-value	معامل الارتباط
0.021	0.617

يتضح لنا من الجدول السابق: أن قيمة P.Value تساوى 0.021 أي 2.1٪، وهي أقل من مستوى المعنوية 5٪، وبالتالي فإننا نرفض الفرض العددي ونقبل الفرض البديل القائل بأن معامل الارتباط بين المتغيرين (الدخل والاستهلاك) أكبر من الصفر.

[2] مثال

فيما يلي بيان بالتقديرات الخاصة بعشرة طلاب الفرقة الثانية كلية التجارة بجامعة عين شمس، في مادتي المحاسبة والإحصاء:

تقديرات مادة الإحصاء	تقديرات مادة المحاسبة
مقبول	جيد
مقبول	مقبول
ضعيف جداً	جيد جداً
جيد جداً	ضعيف
مقبول	جيد
جيد	جيد
مقبول	ممتاز
جيد جداً	ضعيف جداً
مقبول	مقبول
مقبول	جيد


المطلوب:

- أ- حساب معامل ارتباط سبيرمان للرتب.
- ب- اختبار معنوية معامل الارتباط (يكتفي بالاختبار من طرفين فقط).
وذلك عند مستوى معنوية 5% .

في البداية يتم تكويد التقديرات السابقة كما يلي:

التقدير	ممتاز	جيد جداً	جيد	مقبول	ضعيف	ضعيف جداً
الكود	6	5	4	3	2	1

ادخال البيانات:



الخطوات:

(1) افتح قائمة Analyze، ومن القائمة الفرعية لـ Correlate اختر

Bivariate ..، سوف يظهر لك المربع الحواري التالي:



في المربع الحواري الذي أمامك: قم بما يلي:

أ- انقل كل من (account, stat) إلى المربع الذي بعنوان

. Variables:

ب- قم بتعطيل الاختيار Pearson . لأننا لا نريد إظهار نتائج اختبار

(بيرسون)

ج- ثم قم بتنشيط الاختيار Spearman

د- والاختبار الافتراضي لاختبار المعنوية الاختبار من طرفيين- Two-

tailed نتركه كما هو نشطا.

ثم اضغط Ok ، سوف تظهر لك النافذة الخاصة بمخرجات هذا الاختبار. (2)

Nonparametric Correlations

Correlations

			ACCOUNT	STAT
Spearman's rho	ACCOUNT	Correlation Coefficient	1.000	-.692*
		Sig. (2-tailed)		.027
		N	10	10
	STAT	Correlation Coefficient	-.692*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.027	.
		N	10	10

*. Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

توزيع النتائج والتعليق

p-value	معامل الارتباط
0.027	0.692 -

يتضح لنا من الجدول السابق :

أن هناك ارتباط عكسي بين درجات مادتي المحاسبة والإحصاء (-0.692). كما يلاحظ – أيضا – أن قيمة P.Value تساوى 0.027 أي 2.7٪، وهي أقل من مستوى المعنوية 5٪، وبالتالي فإننا نرفض الفرض العددي ونقبل الفرض البديل – أي أن علاقة الارتباط معنوية.

مصفوفة الارتباط Correlation Matrix

هي مصفوفة تتضمن معاملات ارتباط لأكثر من متغيرين.

مثال [3]

المطلوب إعداد مصفوفة الارتباط للمتغيرات التالية:


X4	X3	X2	X1
24	10	35	12
18	8	20	20
10	5	45	15
6	14	60	4
16	12	33	11
17	11	50	14
11	15	36	25
10	18	25	16
15	20	44	14
45	15	12	18
25	4	15	24
33	11	15	14

ادخال البيانات:

	x1	x2	x3	x4	var
1	12.00	35.00	10.00	24.00	
2	20.00	20.00	8.00	18.00	
3	15.00	45.00	5.00	10.00	
4	4.00	60.00	14.00	6.00	
5	11.00	33.00	12.00	16.00	
6	14.00	50.00	11.00	17.00	
7	25.00	36.00	15.00	11.00	
8	16.00	25.00	18.00	10.00	
9	14.00	44.00	20.00	15.00	
10	18.00	12.00	15.00	45.00	
11	24.00	15.00	4.00	25.00	
12	14.00	15.00	11.00	33.00	
13					
14					

الخطوات:

- 1) افتح قائمة Analyze، ومن القائمة الفرعية ل Correlate اختر Bivariate .. سوف يظهر لك المربع الحواري التالي:



في المربع الحواري الذي أمامك :

أ- قم بنقل المتغيرات (X1 , X2 , X3 , X4) إلى المربع الذي بعنوان

.Variables

ب- ثم قم بتنشيط الاختيار Person فقط ، وهذا يعني أن معاملات الارتباط التي ستظهر في المصفوفة هي معاملات ارتباط بيرسون.

ج- كما أنتا سترى الاختيار Two-tailed كما نشطا ، وهذا معناه – أيضا – أن قيمة Sig. (أو P.Value) التي ستظهر في المصفوفة ستكون لاختبار المعنوية من طرفين.

(2) ثم اضغط OK . سوف تحصل على النتائج الموضحة في نافذة المخرجات Output

التالية :

Correlations

		X1	X2	X3	X4
X1	Pearson Correlation	1.000	-.594*	-.225	.241
	Sig. (2-tailed)	.	.042	.483	.450
	N	12	12	12	12
X2	Pearson Correlation	-.594*	1.000	.181	-.728**
	Sig. (2-tailed)	.042	.	.573	.007
	N	12	12	12	12
X3	Pearson Correlation	-.225	.181	1.000	-.103
	Sig. (2-tailed)	.483	.573	.	.750
	N	12	12	12	12
X4	Pearson Correlation	.241	-.728**	-.103	1.000
	Sig. (2-tailed)	.450	.007	.750	.
	N	12	12	12	12

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

تفيغ النتائج :

القرار	P.Value	قيمة معامل الارتباط	المتغيرات
معنوي	0.042	0.594 -	(X2) و (X1)
غير معنوي	0.483	0.225 -	(X3) و (X1)
غير معنوي	0.450	0.241	(X4) و (X1)
غير معنوي	0.573	0.181	(X3) و (X2)
معنوي	0.007	0.728 -	(X4) و (X2)
غير معنوي	0.750	0.103 -	(X4) و (X3)

التعليق:

يلاحظ من الجدول السابق معنوية معامل الارتباط بين (X_1) و (X_2) وبين (X_2) و (X_4) حيث أن قيمة $P.Value$ في الحالتين أقل من 5٪، فيما عدا ذلك كانت $P.Value$ لجميع معاملات الارتباط أكبر من مستوى المعنوية 5٪، مما يعني أن علاقات الارتباط بين هذه المتغيرات غير معنوية.

الارتباط الجزئي Partial Correlation


يعتبر الارتباط الجزئي هو الارتباط بين متغيرين (أو أكثر) مع استبعاد أثر متغير (أو أكثر). ويرجع السبب في استخدام الارتباط الجزئي إلى أن وجود علاقة ارتباط معنوية بين متغيرين قد يكون بسبب ارتباطهما وتأثرهما بمتغير آخر، بحيث بعد استبعاد أثر هذا المتغير قد نحصل على درجة ارتباط مختلفة عنه في حالة عدم استبعاده، ليس هذا فحسب بل يمكن أن تصبح العلاقة غير معنوية.

مثال (٤):

من نفس بيانات المثال رقم (١) : المطلوب حساب معنوية معامل الارتباط بين الدخل والادخار مع الأخذ في الاعتبار أثر متغير عدد الأبناء في الأسرة (الارتباط الجزئي).


الدخل	الإدخار	عدد الابناء في الأسرة
100	15	2
120	10	1
150	30	2
180	40	2
200	45	3
210	20	5
190	80	4
400	50	2
250	100	1
350	60	3
600	90	1

ادخال البيانات:



الخطوات:

- (1) افتح قائمة Analyze، ومن القائمة الفرعية لـ Correlate اختر Partial .. سوف يظهر لك المربع الحواري التالي:



في المربع الحواري الذي أمامك: قم بما يلي:

- أ- انقل كل من (income, savings) إلى المربع الذي بعنوان

Variables:

- ب- ثم قم بنقل المتغير children إلى المربع الذي بعنوان

Controlling for

- ثم اضغط Ok، سوف تظهر لك النافذة الخاصة بمخرجات هذا الاختبار.

--- PARTIAL CORRELATION COEFFICIENTS

Controlling for.. CHILDREN

	INCOME	SAVINGS
--	--------	---------

INCOME	1.0000 (0)	.6022 (-8) P= .
--------	----------------	------------------------

SAVINGS	.6022 (-8) P= .065	1.0000 (0) P= .
---------	---------------------------	------------------------

(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance)

" . " is printed if a coefficient cannot be computed

تفريغ النتائج والتعليق:

p-value	معامل الارتباط
0.065	0.6022

يلاحظ من الجدول السابق: أن قيمة معامل الارتباط الجزئي بين الدخل والادخار— بعد استبعاد أثر متغير عدد الأبناء في الأسرة — أقل من معامل الارتباط في حالة عدم الأخذ في الاعتبار عدد الأبناء، ليس هذا فحسب بل وأصبحت علاقة الارتباط غير معنوية.

ملحوظة أخيرة:

عدم وجود ارتباط خطى بين متغيرين لا يعني بالضرورة عدم وجودة علاقة على الإطلاق بين المتغيرين، لأنه قد يكون هناك علاقة ولكن غير خطية. لذا يتتعين على الباحث أن يكون دقيق في التعبير عن شكل العلاقات بين المتغيرات محل الدراسة.

الفصل السابع

تحليل الانحدار الخطي البسيط
Simple Linear Regression Analysis

تحليل الانحدار الخطي البسيط

Simple Linear Regression Analysis

يمكن تقسيم نماذج الانحدار الخطي - حسب عدد المتغيرات المستقلة (التفسيرية) في النموذج - إلى:

▪ نماذج انحدار بسيطة Simple Regression Models

▪ نماذج انحدار متعددة Multiple – Regression Models

النوع الأول: نماذج الانحدار الخطي البسيط:

تتناول هذه النوعية من النماذج العلاقة بين متغير واحد تابع (Y) ومتغير واحد مستقل (X)، ويأخذ نموذج الانحدار الخطي البسيط الشكل التالي:

$$Y = B_0 + B_1 X$$

النوع الثاني : نماذج الانحدار الخطي المتعدد:

هنا تكون بصفد متغير واحد تابع (Y) وأكثر من متغير مستقل (X)، ويأخذ نموذج الانحدار المتعدد الشكل التالي:

$$Y = B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_3 X_3 + \dots + B_k X_k$$

حيث (k) : تمثل عدد المتغيرات المستقلة

خطوات توفيق نموذج انحدار :

للحكم على صلاحية نموذج الانحدار الذي تم توفيقه للعلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات التفسيرية، لابد وأن يتوافر في هذا النموذج مجموعة من الشروط، يمكن تقسيمها إلى:

أولاً: الشروط النظرية:

١) اتفاق (أو منطقية) إشارات وقيم معاملات الانحدار مع الأساس النظري الذي يحكم الظاهرة محل الدراسة:

فمثلاً، لو أنشأنا بصدق توفيق نموذج إنحدار للعلاقة بين الدخل والإستهلاك، نجد أن الشروط المفروضة على عالم النموذج – وذلك وفقاً لما تقره النظرية الاقتصادية – كما يلى :

أ- أن تكون إشارة معامل الانحدار موجبة وقيمتها أقل من الواحد

الصحيح. على اعتبار أن معامل الانحدار في هذه الحالة يمثل الميل

الحادي للإستهلاك الذي تتراوح قيمته بين الصفر والواحد الصحيح.

ب- كما أن ثابت الانحدار لابد أن يكون قيمته موجبة، حيث يمثل الجزء

الثابت من الإستهلاك بصرف النظر عن مستوى الدخل (أي حتى لو

كان الدخل يساوى صفر).

ويلاحظ هنا: أن عدم توافر هذه الشروط يجعل نموذج الانحدار الذي تم توفيقه غير سليم من الناحية النظرية.

٢) قبول (أو كفاية) القدرة التفسيرية للنموذج:

يقصد بالقدرة التفسيرية لنموذج الانحدار: مدى قدرة المتغيرات المستقلة في النموذج على تفسير التغيرات التي تحدث في المتغير التابع، أو بمعنى آخر نسبة التغيرات التي تحدث في المتغير التابع وتعزى إلى المتغيرات المستقلة.

وبصفة عامة، ليس هناك حد فاصل متفق عليه لهذه النسبة. بل هو أمر نسبي وتقديرى يتوقف على طبيعة الظاهرة التى تحكم هذه العلاقة. فمثلاً، لو أننا بصدق توفيق نموذج إنحدار لسلوك أحد الكوارث الطبيعية كالزلزال، في هذه الحالة لو أن القدرة التفسيرية للنموذج المقترن تتراوح بين 30% و 40% يمكن القول بأنه نموذج جيد، في حين أن النسبة 60% في ظاهرة أخرى من الظواهر الإقتصادية قد نرى أنها غير كافية.

ثانياً: الشروط الرياضية:

تتضمن :

١) المعنوية الكلية لنموذج الانحدار :

يقصد بها اختبار الشكل الدالى للعلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات التفسيرية في نموذج الانحدار. وذلك باستخدام اختبار (F) [F- test].

فمثلاً، لو أننا قد اختربنا نموذج الانحدار الخطى لتمثيل العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة ، فإن اختبار المعنوية الكلية: يقصد به الإجابة على السؤال التالي: هل الشكل الدالى المقترن (النموذج الخطى) هو نموذج مقبول لتمثيل العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات التفسيرية أم لا؟. بحيث أنه في حالة النفي

فإنه يتبع على الباحث محاولة إيجاد نموذج آخر يمكن أن يقدم وصف أفضل للعلاقة بين متغيرات النموذج، لأن يقترح نموذج غير خطى لهذه العلاقة.

كما أن قبول الشكل الدالي المقترن له مدلول آخر: وهو أن هناك معامل واحد على الأقل من معاملات نموذج الانحدار يختلف عن الصفر (معنوي).

٢) المعنوية الجزئية للنموذج :

يقصد بها إختبار معنوية معاملات الانحدار لكل متغير من المتغيرات التفسيرية على حده، بالإضافة إلى ثابت الانحدار. وذلك من خلال إختبار ت [t - test].

٣) مدى توافر شروط الطريقة المستخدمة في تقدير معالم نموذج الانحدار .
يعتبر أشهر هذه الطرق: طريقة المربعات الصغرى العادية OLS. وتتمثل أهم شروط هذه الطريقة في:

أ- اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي :Normality Test

لקי يمكن استخدام كل من إختبار (f) وإختبار (t)، سواء عند إختبار المعنوية الكلية أو المعنوية الجزئية لنموذج الانحدار، يلزم توافر شرط اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي.

ونود الإشارة إلى أن التقيد بهذا الشرط مرتبط بحجم العينة، إذ يعتبر شرطاً ضرورياً في حالة العينات الصغيرة، أما في حالة العينات الكبيرة فيمكن التخلص

عنه. وذلك لأنه وفقاً لنظرية الحد المركزية نجد أن التوزيعات الاحتمالية تؤول إلى التوزيع الطبيعي في حالة العينات التي تزيد حجمها عن 30 مشاهدة⁽¹⁾.

ب- الاستقلال الذاتي للبواقي:

ترجع أهمية دراسة الارتباط الذاتي للبواقي في تحليل الانحدار، إلى أن وجود هذا الارتباط من شأنه أن يجعل قيمة التباين المقدر للخطأ يكون بأقل من قيمته الحقيقة. وبالتالي فإن قيمة إحصاءات الاختبار التي تعتمد على هذا التباين مثل (T) ، (F) ، (R^2) تكون أكبر من قيمتها الحقيقية، مما يجعل القرار الخاص بجودة توفيق النموذج قرار مشكوك في صحته.

ج- اختبار تجانس البواقي (اختبار ثبات التباين) : Homoscedasticity

إن عدم ثبات التباين في نموذج الانحدار من شأنه أن يترتب عليه نفس الآثار المترتبة في حالة وجود ارتباط ذاتي بين البواقي، حيث تكون الاخطاء المعيارية مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية. وبالتالي تصبح هذه التقديرات متحيززة ، الامر الذي يجعل نتائج الاستدلال الإحصائى مشكوك في صحتها⁽²⁾.

وسنوضح بالامثلة العملية كيفية تطبيق الشروط السابقة :

مثال :

¹ Palta, Mari, (2003)," Quantitative Methods in population health: Extensions of ordinary regression", Wiley – IEEE, p 6.

² Berk, Richard A., (2003)," Regression analysis: a constructive critique", Sage publications Inc., p 144.

إذا توافرت لديك البيانات التالية:

الاستهلاك	الدخل
127	158
130	160
129	175
125	157
115	130
119	150
121	152
124	162
97	125
92	115
85	125
114	145
118	140
110	142
119	140
104	138
102	126

المطلوب:

توفيق نموذج انحدار خطى بسيط للبيانات السابقة عند مستوى معنوية 5٪.


الخطوات:

(1) إدخال البيانات:

The screenshot shows the SPSS Data View window titled "regression_1 - SPSS ...". The menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays a data table with 17 rows and 2 columns. The first column is labeled 'y' and the second column is labeled 'x'. The data values are as follows:

	y	x
1	127.00	158.00
2	130.00	160.00
3	129.00	175.00
4	125.00	157.00
5	115.00	130.00
6	119.00	150.00
7	121.00	152.00
8	124.00	162.00
9	97.00	125.00
10	92.00	115.00
11	85.00	125.00
12	114.00	145.00
13	118.00	140.00
14	110.00	142.00
15	119.00	140.00
16	104.00	138.00
17	102.00	126.00

(2) افتح قائمة **Regression**، ومن القائمة الفرعية لـ **Analyze** اختر **Linear**، سوف يظهر المربع الحواري التالي:



في المربع الحواري الذي أمامك:


أ. قم بنقل المتغير التابع [y] Consumption إلى المربع الذي بعنوان

. Respondent

ب. ثم أنقل المتغير المستقل (x) Income إلى المربع الذي بعنوان

. Independent(s)

(3) انقر فوق الاختيار Statistics، سوف يظهر المربع الحواري التالي:



في هذا المربع الحواري :

أ. أنقر بالماوس أمام **Durbin – Watson**، [هو عبارة عن إحصائي

الاختبار الذي سيتم استخدامه في اختبار الفروض الإحصائية حول

. [Residuals الارتباط الذاتي للبواقي


ب. الاختيار الافتراضي لكل من **Model Fit** و **Estimates** سنتركه

كما هو.

ج. ثم اضغط **Continue** للعودة إلى المربع الحواري الأساسي.

4) ومن المربع الحواري الأساسي: أنقر فوق الاختيار **Save** سوف يظهر

المربع الحواري التالي:



في هذا المربع الحواري :

أ. أنقر بالماوس أمام **Unstandardized** من الاختيارات الخاصة بـ

Predicted Values


ب. أنقر بالماوس أمام **standardized** من الاختيارات الخاصة بـ

Residuals

ج. ثم اضغط **Continue** للعودة إلى المربع الحواري الأساسي.

(5) ومن المربع الحواري الأساسي: أنقر فوق الاختيار **Plots** سوف يظهر المربع

الحواري التالي:



في هذا المربع الحواري:

أ. أنقر أمام **Normal probability plot** من الاختيارات الموجودة

. **Standardized Residual Plots** تحت

ب. ثم اضغط **Continue** للعودة إلى المربع الحواري الأساسي.

6) ومن المربع الحواري الأساسي: اضغط **ok**، سنحصل على مخرجات

تحليل الانحدار، كما يلي:

1. جدول معامل التحديد واحصائي اختبار Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.886 ^a	.785	.771	6.3983	2.224

a. Predictors: (Constant), income

b. Dependent Variable: consumption

يتضمن هذا الجدول البيانات التالية:

أ) **R** : معامل الارتباط (معامل ارتباط بيرسون بين المتغير التابع والمتغير

المستقل).

ب) **R Square** : معامل التحديد (مربع معامل الارتباط).

ج) **Adjusted R Square** : معامل التحديد المعدل.

د) **Std. Error of the Estimate** : الخطأ المعياري

المقدر، وهو عبارة عن الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ

⁽¹⁾ (MSE).

ه) **Durbin-Watson** : قيمة إحصاء اختبار (دارбин – واطسون)

الذي يستخدم في الحكم على الارتباط الذاتي للبيانات.

2. جدول تحليل التباين : ANOVA

ANOVA ^{a,b}					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	2244.036	1	2244.036	54.814
	Residual	614.082	15	40.939	
	Total	2858.118	16		

a. Predictors: (Constant), income
b. Dependent Variable: consumption

يتضمن هذا الجدول البيانات التالية :

أ) **Model** : مصدر التباين في نموذج الانحدار.

ب) **Sum of Squares** : مجموع المربعات.

MSE ¹ يوجد في جدول تحليل التباين.

- ج) df : درجات الحرية.
- د) Mean Square : متوسط مجموع المربعات.
- ه) F : قيمة (F) المحسوبة.
- و) Sig : قيمة الاحتمال P.Value ، التي تستخدم في الحكم على المعنوية الكلية للنموذج.

3. جدول معاملات الانحدار :

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	8.149	14.326	.569	.578	
	income	.735	.099	.886	7.404	.000

a. Dependent Variable: consumption

يتضمن هذا الجدول البيانات التالية :

أ) Unstandardized Coefficients : والتي تتضمن كل

من قيمة الثابت Constant ، معامل الانحدار (معاملات

نموذج الانحدار غير المعيارية) ، بالإضافة إلى الخطأ المعياري

معاملات النموذج .(Std. Error)

ب) Standardized Coefficients معامل بيتا (المعاملات


المعيارية).

ج) t : قيمة (t) المحسوبة لمعاملات النموذج.

د) **Sig** : قيمة الاحتمال P.Value [التي تستخدم في الحكم على

المعنوية الجزئية لنموذج الانحدار (معنوية معاملات النموذج)].


4. شكل بياني للعلاقة بين الاحتمال التجميعي المشاهد والاحتمال التجميعي المتوقع



من خلال فحص هذا الشكل البياني يتم الحكم على مدى توافر الشرط الخاص باعتدالية التوزيع الاحتمالي للباقي نموذج الانحدار.

ملاحظة :

-أ- بالرجوع إلى نافذة البيانات **Data View** ، ستجد أنه قد تم إضافة عمود للبواقي المعيارية (**Standardized**) بعنوان **res_1** ، وعمود آخر للقيم المقدرة (**Residuals**) لـ **لمتغير التابع (\hat{y})** بعنوان **pre_1** ، كما هو موضح بالشكل التالي:



The screenshot shows the SPSS Data Editor window titled "regression_1 - SPSS Data Editor". The menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The data view shows a table with 17 rows and 5 columns. The columns are labeled y, x, pre_1, zre_1, and var. The first column contains row numbers from 1 to 17. The y column contains values like 127.00, 130.00, etc. The x column contains values like 158.00, 160.00, etc. The pre_1 column contains values like 124.2186, 125.6878, etc. The zre_1 column contains values like .43471, .67396, etc. The last column, var, is empty. The status bar at the bottom right says "SPSS Processor is ready".


	y	x	pre_1	zre_1	var
1	127.00	158.00	124.2186	.43471	
2	130.00	160.00	125.6878	.67396	
3	129.00	175.00	136.7070	-1.20454	
4	125.00	157.00	123.4839	.23695	
5	115.00	130.00	103.6493	1.77400	
6	119.00	150.00	118.3416	.10290	
7	121.00	152.00	119.8109	.18585	
8	124.00	162.00	127.1570	-.49341	
9	97.00	125.00	99.97623	-.46516	
10	92.00	115.00	92.63007	-.09847	
11	85.00	125.00	99.97623	-2.34064	
12	114.00	145.00	114.6686	-.10449	
13	118.00	140.00	110.9955	1.09474	
14	110.00	142.00	112.4647	-.38521	
15	119.00	140.00	110.9955	1.25103	
16	104.00	138.00	109.5262	-.86370	
17	102.00	126.00	100.7109	.20148	

-ب- البيانات الخاصة بالقيم المعيارية بالبواقي قد يتم الاعتماد عليها عند دراسة اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي حسابياً.


ومن خلال التمثيل البياني لهذهين العمودين، نحصل على رسم بياني للعلاقة بين الباقي المعيارية والقيم المتوقعة المتغير التابع (الاستهلاك). ثم من خلال فحص هذا الشكل البياني يتم الحكم على مدى توافر الشرط الخاص بثبات التباين في نموذج الانحدار.

الخطوات:

- 1) افتح قائمة **Graphs** واختـر **Scatter** سوف يظهر المربع الحواري التالي :




- 2) أنقر مرة واحدة بالماوس فوق **Simple**، ثم أنقر فوق **Define** سيظهر المربع الحواري التالي :



في هذا المربع الحواري:

- أ) قم بنقل المتغير الخاص بالقيم المعيارية للبواقي **Standard** **Y Axis** [zre_1] إلى المربع الذي بعنوان **Residual**
- ب) قم بنقل المتغير الخاص بالقيم المتوقعة (الاتجاهية) للمتغير التابع **Unstandardized Predicted Value** [pre_1] إلى **X Axis** المربع الذي بعنوان
- (3) ثم اضغط **ok** سوف نحصل على الشكل البياني التالي في صفحة المخرجات:



حتى هنا تكون قد انتهينا من استعراض المخرجات الخاصة بتحليل الانحدار،
سنقوم الآن بشرح الخطوات النهائية للتعليق على النتائج:

التعليق على النتائج والحكم على صلاحية نموذج الانحدار الذي تم توفيره:

أولاً : نموذج الانحدار المقدر :

$$Y = 8.149 + 0.735 X$$

من نموذج الانحدار المقدر السابق، يتضح لنا:

- الجزء الثابت (β_0) : نجد أنه يساوى (8.149) .
- معامل الانحدار (β_1) : يساوى (0.735).

ثانياً: الشروط النظرية.

١) اتفاق (أو منطقية) إشارات قيمة معاملات الانحدار:

يلاحظ هنا أن الظاهرة محل الدراسة هي ظاهرة اقتصادية، تفترض في نموذج الانحدار ما يلي :

- أ. الجزء الثابت من الاستهلاك له قيمة موجبة (أكبر من الصفر).
- ب. معامل الانحدار (الميل الحدي للاستهلاك) له قيمة موجبة، وتتراوح بين الصفر والواحد الصحيح.

وبالرجوع إلى نموذج الانحدار المقدر :

$$\text{Consumption} = 8.149 + 0.735 \text{ Income}$$

نجد أنه لا يوجد تعارض بين الشروط النظرية للظاهرة محل الدراسة ونتائج نموذج الانحدار المقدر للعلاقة بين الدخل والإستهلاك.

ملاحظة هامة :

لا يشترط دائماً أن تكون طبيعة العلاقات التي تحكم سلوك وحدود المتغيرات الداخلية في النموذج معروفة أو محددة على وجه الدقة، حيث أنه في بعض الأحيان لا يوجد أساس نظري معين لبعض الظواهر. في هذه الحالة يستطيع الباحث أن يتجاوز هذه المرحلة من مراحل فحص نموذج الانحدار الجيد، وينتقل مباشرة إلى الشروط الأخرى.

(2) القدرة التفسيرية للنموذج :

يتم الحكم على القدرة التفسيرية لنموذج الانحدار من خلال معامل التحديد ($R-Sq$) أو معامل التحديد المعدل [$(adj\ R-Sq)$]، ويفضل بالطبع الإعتماد على الأخير لأنه يكون أكثر دقة.

طريقة التعليق :

بالرجوع إلى الجدول الذي يتضمن النتائج الخاصة بمعامل التحديد، نجد أن معامل التحديد المعدل يساوي 77.1 % ، وهذا معناه أن المتغير المستقل (متغير الدخل) يفسر 77.1 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (الاستهلاك)، أو أن 77.1 % من التغيرات التي تحدث في الاستهلاك تعزى إلى الدخل، والباقي 22.9 % يرجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي.

ثالثاً: الشروط الرياضية :

(1) المعنوية الكلية للنموذج :

الفرضيات الإحصائية:

الفرض العددي (H_0): نموذج الانحدار غير معنوي.

الفرض البديل (H_1): نموذج الانحدار معنوي.

الفرض بشكل آخر:

الفرض العددي (H_0): جميع معاملات الانحدار غير معنوية
(لا تختلف عن الصفر).

الفرض البديل (H_1): واحد على الأقل من معاملات الانحدار معنوية
(تحتاج إلى تختلف عن الصفر).

نفيخ النتائج والتعليق عليها:

جدول تحليل التباين ANOVA

لنموذج الانحدار

P. Value	F المحسوبة F _{cal}	متوسط الربعات MS	مجموع الربعات SS	درجات الحرية DF	المصدر Source
0.0000	54.814	2244.036	2244.036	1	انحدار
°	°	40.939	614.082	15	الخطأ
°	°	*	2858.118	16	الكل

التعليق:

يتضح من جدول تحليل التباين : أن قيمة الإحتمال **P.Value** تساوى صفر ، وهي أقل من مستوى المعنوية 5 % ، وبالتالي فإننا نرفض الفرض العددي القائل بأن نموذج الانحدار غير معنوي ، وهذا يعني أن هناك واحد على الأقل من معاملات الانحدار تختلف عن الصفر.

2) المعنوية الجزئية للنموذج :

المفهوم :

في الخطوة السابقة توصلنا إلى نتيجة مؤداها أن هناك واحد على الأقل من معاملات الانحدار معنوية وتحتفل عن الصفر. ولتحديد أيها من هذه المعاملات التي تكون معنوية ، نقوم بإجراء ما يطلق عليه اختبار المعنوية الجزئية للنموذج.

الآدلة: يتم استخدام اختبار (ت) [**T - test**] :

شكل_الفروض_الإحصائية:

- أ- بالنسبة لـ (B_0) :

$$H_0: B_0 = 0$$

$$H_1: B_0 \neq 0$$

- ب- بالنسبة لـ (B_1) :

$$H_0: B_1 = 0$$

$$H_1: B_1 \neq 0$$

تغريغ النتائج والتعليق عليها:

نتائج اختبار معنوية معاملات الانحدار

P. Value	قيمة إحصائي الاختبار (ت)	قيمة معاملات الانحدار	المعاملات
0.578	0.569	8.149	B_0
0.000	7.404	0.735	B_1

□ التعليق:

بالنسبة لـ (B_0) ، نجد أن قيمة الإحتمال P.Value تساوى 0.578 وهي أكبر من مستوى المعنوية 5 % ، وبالتالي فإننا نقبل الفرض العددي القائل بأن المقدار الثابت في نموذج الانحدار غير معنوي.

أما بالنسبة لـ (B_1) ، نجد أن قيمة الإحتمال P.value تساوى 0.000 وهي أقل من مستوى المعنوية 5 % ، وبالتالي فإننا نرفض الفرض العددي القائل بأن معامل الانحدار (B_1) في نموذج الانحدار غير معنوي.

(3) شروط المربعات الصغرى العادية.

الشرط الأول: اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي Normality Test

□ الفروض الإحصائية:

الفرض العددي (H_0): البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.


الفرض البديل (H_1): البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي.

ويتم دراسة اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي بطريقتين:

الطريقة الأولى: بيانياً

وذلك من خلال فحص الشكل البياني للعلاقة بين الاحتمال التجميعي المشاهد والاحتمال التجميعي المتوقع للبواقي المعيارية، بحيث إذا كانت النقاط تقع بشكل متقارب جداً على الخط الواصل الركن الأيمن العلوي والركن الأيسر السفلي أو تتوزع هذه النقاط بشكل عشوائي على جانبي هذا الخط ، في كلتا الحالتين يقال أن الأخطاء تتوزع توزيعاً طبيعياً. أما إذا تمكنا من رصد نمط معين لتوزيع هذه النقاط في هذه الحالة يقال أن الأخطاء لا تتوزع توزيعاً طبيعياً.

وبالرجوع إلى المثال الحالي و كما هو موضح بالشكل التالي، نجد أن البواقي تتوزع بشكل عشوائي على جانبي الخط، مما يعني أن البواقي تتوزع توزيعاً معتدلاً (أي تتبع التوزيع الطبيعي).




الطريقة الثانية: حسبياً باستخدام اختبار كل من اختبار (كلوموجروف – سمنروف)،
واختبار (شايرو – ويلك):

الخطوات

1) افتح قائمة Analyze ومن القائمة الفرعية لـ Descriptive

اختر Explore Statistics سيظهر لنا المربع الحواري التالي:



: (2


Standardized Residual (

.Dependent List

.Plots Display (

Plots.. (

:



: : (3

Normality Plots with tests (

.None Boxplots (

Stem – and – Leaf

Continue (

OK (4

:Output

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Standardized Residual	.129	17	.200*	.970	17	.780

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

نفيج النتائج والتعليق :

نتائج اختبار اعتمالية التوزيع الاحتمالي للبواقي

P. value	درجات الحرية	إحصائي الاختبار	بيان
0.20	17	0.129	اختبار كلومجروف – سيمروف
0.780	17	0.970	اختبار ويلك – شابيرو

■ طريقة التعليق:

يتضح من نتائج التحليل الاحصائي أن قيمة $P.Value$ أكبر من مستوى المعنوية 0.05 في كلا الاختبارين، ومن ثم فإننا نقبل الفرض العددي القائل بأن البوافي تتبع التوزيع الطبيعي، وهو ما يدعم النتيجة التي توصلنا إليها من خلال الرسم البياني. وبالتالي فإن الشرط الأول [شرط اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبوافي] من شروط استخدام طريقة المربعات الصغرى العادلة متوفراً.

الشرط الثاني: الاستقلال الذاتي للبوافي

■ الفروض الإحصائية:

الفرض العددي (H_0): يوجد استقلال بين البوافي (لا يوجد ارتباط ذاتي بين البوافي).

الفرض البديل (H_1): لا يوجد استقلال بين البوافي (يوجد ارتباط ذاتي بين البوافي).

■ أدلة الحكم:

يتم الحكم على مدى وجود استقلال ذاتي بين البوافي من خلال اختبار

Durbin — Watson Test

■ خطوات تنفيذ الاختبار:

الخطوة الأولى: حساب إحصائي الاختبار (DW):

من جدول معامل التحديد وإحصائى اختبار Durbin-Watson السابق الإشارة إليه عند استعراض المخرجات، نجد أن قيمة هذا الإحصائي تساوى .(2.224)

الخطوة الثانية: إيجاد القيمة الحرجة (وذلك من جدول القيم الحرجة لـ Durbin – Watson):

بصفة عامة، يتضمن جدول القيم الحرجة لـ Durbin – Watson قيمتين حديتين: القيمة الدنيا ويرمز لها بالرمز (d_L)، والقيمة العليا ويرمز لها بالرمز (d_u). وذلك وفقاً لعدد المتغيرات المستقلة (K)، ودرجات حرية الخطأ (n). وهذا نجد هاتين القيمتين عند $k = 15$ ، $n = 15$ ، كما يلي:

$$d_L = 1.08$$

$$d_u = 1.36$$

الخطوة الثالثة: اتخاذ القرار :
يتم اتخاذ القرار بشأن قبول أو رفض الفرض العددي حول الارتباط الذاتي للبواقي،
وفقاً للقواعد الآتية :

- 1) نرفض الفرض العددي في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان $(4 - d_L) < DW < 4$.
الحالة الثانية: إذا كان $(0 < DW < d_L)$.

- 2) ونقبل الفرض العددي في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان $(2 < DW < 4 - d_u)$.

الحالة الثانية: إذا كان ($d_u < DW < 2$).

٣) هذا بالإضافة إلى أنه هناك حالتين يكون فيهما القرار غير محدد، بمعنى

أننا لانستطيع تحديد هل يوجد ارتباط ذاتي أم لا:

الحالة الأولى: ($4 - d_u < DW < 4 - d_L$).

الحالة الثانية: عندما ($d_L < DW < d_u$).

وبما أن:

أ- قيمة إحصائي اختبار DW يساوى 2.224.

ب- كما أن d_u تساوى 1.36 (من جدول القيم الحرجة لـ $Durbin$) –

[عند K يساوى واحد صحيح (حسب عدد المتغيرات المستقلة في

النموذج) أمام درجات حرية الخطأ تساوى 15 (من جدول تحليل التباين) ،

وعند مستوى معنوية 5 %. إذا ($4 - 1.36 = 2.64$).

ج- وبالتالي فإن ($2 < DW < 4 - d_u$) ، حيث $2 < DW < 4 - d_u$.

ومن ثم يكون القرار:

قبول الفرض العددي القائل بأنه يوجد استقلال بين الباقي (أي لا يوجد ارتباط

ذاتي بين الباقي). وبالتالي فإن الشرط الثاني [شرط الاستقلال الذاتي للباقي] من


شروط استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية متوافر.

الشرط الثالث : اختبار تجانس الباقي (اختبار ثبات التباين):

يتم الحكم على مدى تجانس أو ثبات تباين الأخطاء بطريقتين:

الطريقة الأولى: من خلال الرسم البياني:

وذلك من خلال فحص شكل انتشار الباقي المعيارية مع القيم الاتجاهية للمتغير التابع ، كما هو موضح بالشكل التالي (من مخرجات تحليل الانحدار):



يلاحظ هنا أن : إنتشار وتوزيع الباقي يأخذ شكل عشوائي على جانبي الخط الذي يمثل الصفر (وهو الخط الذي يفصل بين الباقي السالبة والباقي الموجبة) ، حيث أنه لا يمكننا رصد نمط أو شكل معين لتباعين هذه الباقي ، وهو ما يعني أن هناك تجانس أو ثباتات في تباعين الأخطاء. وبالتالي فإن الشرط الثالث [شرط ثبات التباعين للباقي] من شروط استخدام طريقة المربعات الصغرى العادلة متوفّر.

ولزيادة التأكيد من النتيجة التي توصلنا إليها، سوف نقوم بتطبيق طريقة Goldfield – Quandt لاختبار ثبات التباين.


الطريقة الثانية: الطريقة الحسابية (طريقة Goldfield – Quandt)

الخطوات:

1. يتم ترتيب المشاهدات ترتيبا تصاعديا أو تنازليا وفقا لأحد المتغيرات المستقلة. كما يلي:

أ. افتح قائمة Data واختر Sort Cases سوف يظهر المربع الحواري

التالي:



- ب. قم بنقل المتغير المستقل (x) Income إلى المربع الذي بعنوان Sort by. ولاحظ هنا أن الاختيار الافتراضي لطريقة ترتيب المشاهدات هي الترتيب التصاعدي Ascending (سنتركه كما هو).

ت. اضغط ok، ستجد انه قد تم ترتيب المشاهدات ترتيبا تصاعديا (الأصغر فالأكبر) وفقا للمتغير المستقل (الدخل)، كما هو موضح بالشكل التالي :

	y	x	pre_1	zre_1	var
1	92.00	115.00	92.63007	-.09847	
2	97.00	125.00	99.97623	-.46516	
3	85.00	125.00	99.97623	-2.34064	
4	102.00	126.00	100.7109	.20148	
5	115.00	130.00	103.6493	1.77400	
6	104.00	138.00	109.5262	-.86370	
7	118.00	140.00	110.9955	1.09474	
8	119.00	140.00	110.9955	1.25103	
9	110.00	142.00	112.4647	-.38521	
10	114.00	145.00	114.6686	-.10449	
11	119.00	150.00	118.3416	.10290	
12	121.00	152.00	119.8109	.18585	
13	125.00	157.00	123.4839	.23695	
14	127.00	158.00	124.2186	.43471	
15	130.00	160.00	125.6878	.67396	
16	124.00	162.00	127.1570	-.49341	
17	129.00	175.00	136.7070	-1.20454	

2. يتم استبعاد 20% من المشاهدات في المنتصف⁽¹⁾، أي سيتم استبعاد 3.4 مشاهدة، وللتقرير سوف نستبعد 3 مشاهدات. والمشاهدات التي سيتم استبعادها هي المشاهدة رقم(8)، (9)، (10). في هذه الحالة سيكون لدينا


$$(3.4 = 0.20 \times 17)^1$$

سلسلتين، كل سلسلة تتضمن 7 مشاهدات: السلسلة الأولى تتضمن المشاهدات رقم (1)، (2)..... إلى المشاهدة رقم (7)، والسلسلة الثانية وتتضمن المشاهدات رقم (11)، (12)..... إلى المشاهدة رقم (17).

3. ثم تقوم بحساب مجموع مربعات الخطأ (SSE) لكل سلسلة من السلسلتين، وذلك من جدول تحليل التباين لمعادلة الانحدار لكل سلسلة. وفيما يلي الخطوات بالتفصيل:

(أ) يتم الإبقاء على المشاهدات الخاصة بالسلسلة الأولى واستبعاد باقي المشاهدات، كما يلي:

افتح قائمة Data واختر Select Cases سوف يظهر المربع الحواري التالي:




في المربع الحواري الذي أمامك:

انقر أمام طريقة الاختيار Based on time or case range ثم انقر فوق

سوف يظهر المربع الحواري التالي:



في المربع الحواري الذي أمامك: قم بإدخال بداية ونهاية رقم المشاهدات التي سيتم الإبقاء عليها. ثم اضغط Continue للعودة للمربع الحواري السابق، ثم اضغط ok، ستجد أن البرنامج قد أبقى على المشاهدات السبعة الأولى فقط واستبعاد باقي المشاهدات، كما هو موضح بالشكل التالي:



The screenshot shows the SPSS Data Editor window titled "regression_1 - SPSS Data Editor". The menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays a data table with 17 rows and 6 columns. The columns are labeled: y, x, pre_1, zre_1, and var. The first column contains row numbers from 1 to 17. The second column (y) contains values like 92.00, 97.00, etc. The third column (x) contains values like 115.00, 125.00, etc. The fourth column (pre_1) contains values like 92.63007, 99.97623, etc. The fifth column (zre_1) contains values like -.09847, -.46516, etc. The last column (var) is empty. The status bar at the bottom right says "SPSS Processor is ready".

	y	x	pre_1	zre_1	var
1	92.00	115.00	92.63007	-.09847	
2	97.00	125.00	99.97623	-.46516	
3	85.00	125.00	99.97623	-2.34064	
4	102.00	126.00	100.7109	.20148	
5	115.00	130.00	103.6493	1.77400	
6	104.00	138.00	109.5262	-.86370	
7	118.00	140.00	110.9955	1.09474	
8	119.00	140.00	110.9955	1.25103	
9	110.00	142.00	112.4647	-.38521	
10	114.00	145.00	114.6686	-.10449	
11	119.00	150.00	118.3416	.10290	
12	121.00	152.00	119.8109	.18585	
13	125.00	157.00	123.4839	.23695	
14	127.00	158.00	124.2186	.43471	
15	130.00	160.00	125.6878	.67396	
16	124.00	162.00	127.1570	-.49341	
17	129.00	175.00	136.7070	-1.20454	

ثم نقوم بعد ذلك بتنفيذ خطوات إيجاد نموذج انحدار (y) على (x)

للسلسلة الأولى. ومن مخرجات هذا التحليل، سوف نهتم بجدول

تحليل التباين التالي:

ANOVA^b


Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	431.168	1	431.168	5.237	.071 ^a
Residual	411.690	5	82.338		
Total	842.857	6			

a. Predictors: (Constant), income

b. Dependent Variable: consumption

من هذا الجدول نجد أن: مجموع مربعات الخطأ (SSE)₍₁₎ للسلسلة الأولى تساوي (411.690).

(ب) وبنفس الأسلوب يتم إيجاد مجموع مربعات الخطأ (SSE)₍₂₎ للسلسلة الثانية كما يلي:



	y	x	pre_1	zre_1
1	92.00	115.00	92.63007	-.09847
2	97.00	125.00	99.97623	-.46516
3	85.00	125.00	99.97623	-2.34064
4	102.00	126.00	100.7109	.20148
5	115.00	130.00	103.6493	1.77400
6	104.00	138.00	109.5262	-.86370
7	118.00	140.00	110.9955	1.09474
8	119.00	140.00	110.9955	1.25103
9	110.00	142.00	112.4647	-.38521
10	114.00	145.00	114.6686	-.10449
11	119.00	150.00	118.3416	.10290
12	121.00	152.00	119.8109	.18585
13	125.00	157.00	123.4839	.23695
14	127.00	158.00	124.2186	.43471
15	130.00	160.00	125.6878	.67396
16	124.00	162.00	127.1570	-.49341
17	129.00	175.00	136.7070	-1.20454

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	53.176	1	53.176	5.932	.059 ^a
Residual	44.824	5	8.965		
Total	98.000	6			

a. Predictors: (Constant), income

b. Dependent Variable: consumption

إذا مجموع مربعات الخطأ (SSE)₍₂₎ للسلسلة الثانية تساوي (44.824).

(ج) ثم يتم حساب قيمة (\hat{F}) المحسوبة، كما يلي:

$$\hat{F} = \frac{(SSE)_2}{(SSE)_1} = \frac{44.824}{411.690} = 0.1088$$

(٤) ويتم مقارنة (\hat{F}) المحسوبة بنظيرتها الجدولية بدرجات حرية الخطأ في السلسليتين ومستوى المعنوية (α) ، فإذا كانت (\hat{F}) المحسوبة أقل من (F) الجدولية فإننا نقبل الفرض العددي القائل بأن هناك تجانس أو ثبات في تباين الأخطاء، والعكس صحيح.

وهنا نجد أن قيمة (\hat{F}) المحسوبة تساوي 0.1088 وهي أقل من القيمة الجدولية $F_{(5,5,0.05)}$ التي تساوى 5.05 ، إذا نقبل الفرض العددي القائل بأن هناك تجانس أو ثبات في تباين الأخطاء. وهو ما يتفق مع النتيجة التي توصلنا إليها من الرسم البياني.

الفصل الثامن

تحليل الانحدار المتعدد

Multiple Regression

الفصل الثامن

تحليل الانحدار الخطى المتعدد

Multiple Linear Regression

يتم تطبيق نفس خطوات وشروط الانحدار البسيط، ولكن يضاف شرط رابع إلى الشروط التي تتطلبها طريقة المربعات الصغرى العادية OLS ، وهو شرط عدم وجود ازدواج خطى بين المتغيرات التفسيرية .**Multicollinearity**

يقصد بالازدواج الخطى:

وجود علاقة ارتباط قوية ومعنوية بين اثنين أو أكثر من المتغيرات التفسيرية. ويعتبر من أهم الآثار السلبية المترتبة على وجود الازدواج الخطى بين المتغيرات التفسيرية: عدم استقرار معاملات الانحدار، بالإضافة إلى عدم توافر صفة الاعتمادية لهذه المعاملات⁽¹⁾.

يتم التأكيد من هذا الشرط بإحدى الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى: فحص مصفوفة الارتباط بين المتغيرات التفسيرية، بحيث يمكن الحكم بعدم وجود ازدواج خطى بين المتغيرات المستقلة في حالة أن يتراوح معاملات الارتباط بين 0.7^- ، 0.7^+ .

¹ Makridakis, Spyros, (1998), " Forecasting: methods & applications", 3 rd Edition, John Wiley & sons Inc., p 288.

الطريقة الثانية: من خلال الاعتماد على معامل تضخم التباين Variance لكل متغير من المتغيرات المستقلة. بحيث إذا كان قيمة (VIF) أقل من (5) فإنه يمكن الحكم بعدم وجود ارذواج خطى.

مثال: بفرض توافر البيانات التالية :

X3	X2	X1	Y
2.010	0.993	1.350	4.40
2.000	1.020	0.465	3.30
1.990	0.882	0.387	4.30
2.500	0.889	0.373	3.90
6.420	1.320	0.889	4.10
3.770	0.794	1.140	4.20
6.940	0.995	0.508	4.30
6.970	0.927	0.447	5.20
6.120	0.720	0.308	5.10
4.240	0.358	0.508	5.00
8.110	0.898	0.546	4.70
2.000	0.110	0.368	4.50
3.290	0.170	0.661	4.32
4.420	0.188	0.901	5.50
3.790	0.172	0.665	5.04
3.940	0.160	0.737	5.00
4.650	0.350	0.627	4.96
4.910	0.164	0.653	6.00
5.000	0.168	0.683	5.80
5.040	0.156	0.596	6.02

المطلوب: توفيق نموذج انحدار خطى للبيانات السابقة، عند مستوى معنوية 5٪.

الخطوات:

1) إدخال البيانات كما يلي:


	y	x1	x2	x3	
1	4.40	1.350	.993	2.010	
2	3.30	.465	1.020	2.000	
3	4.30	.387	.882	1.990	
4	3.90	.373	.889	2.500	
5	4.10	.889	1.320	6.420	
6	4.20	1.140	.794	3.770	
7	4.30	.508	.995	6.940	
8	5.20	.447	.927	6.970	
9	5.10	.308	.720	6.120	
10	5.00	.508	.358	4.240	
11	4.70	.546	.898	8.110	
12	4.50	.368	.110	2.000	
13	4.32	.661	.170	3.290	
14	5.50	.901	.188	4.420	
15	5.04	.665	.172	3.790	
16	5.00	.737	.160	3.940	
17	4.96	.627	.350	4.650	
18	6.00	.653	.164	4.910	
19	5.80	.683	.168	5.000	
20	6.02	.596	.156	5.040	
21					

2) افتح قائمة Analyze ، ومن القائمة الفرعية لـ Regression اختر الأمر Linear ، سوف يظهر المربع الحواري التالي :



في المربع الحواري الذي أمامك:

- أ. قم بنقل المتغير التابع [y] إلى المربع الذي بعنوان **Respondent**.
- ب. ثم أنقل المتغيرات المستقلة (X1, X2, X3) إلى المربع الذي بعنوان **Independent(s)**.
- ج. أنقر فوق الاختيار **Statistics**، سوف يظهر المربع الحواري التالي:



في هذا المربع الحواري :

أ. أنقر بالماوس أمام **Durbin – Watson**، [هو عبارة عن إحصائي

الاختبار الذي سيتم استخدامه في اختبار الفروض الإحصائية حول

. [Residuals الارتباط الذاتي للبواقي

ب. ثم أنقر أمام **Collinearity diagnostics** [وهو عبارة عن

الأمر الخاص بتحليل الازدواج الخطى بين المتغيرات المستقلة الداخلة

في نموذج الانحدار].


ج. ونترك الاختيار الافتراضي لكل من **Model Fit** و **Estimates**

كما هو نشطا..

د. ثم اضغط **Continue** للعودة إلى المربع الحواري الأساسي.

٣) ومن المربع الحواري الأساسي: أنقر فوق الاختيار Save سوف يظهر

المربع الحواري التالي:



في هذا المربع الحواري :

أ. أنقر بالماوس أمام **Unstandardized** من الاختيارات الخاصة بـ


Predicted Values

ب. أنقر بالماوس أمام **standardized** من الاختيارات الخاصة بـ

Residuals

ج. ثم اضغط **Continue** للعودة إلى المربع الحواري الأساسي.

٤) ومن المربع الحواري الأساسي: أنقر فوق الاختيار **Plots** سوف يظهر المربع الحواري التالي:



- في هذا المربع الحواري:
- أ. أنقر أمام **Normal probability plot** من الاختيارات الموجدة . **Standardized Residual Plots**
 - ب. ثم اضغط **Continue** للعودة إلى المربع الحواري الأساسي.

٥) ومن المربع الحواري الأساسي: اضغط **OK**، سنحصل على مخرجات تحليل الانحدار.

التعليق على النتائج والحكم على صلاحية نموذج الانحدار الذي تم توفيقه:

أولاً: نموذج الانحدار المقدر:

$$Y = 4.421 + 0.345 X_1 - 1.367 X_2 + 0.209 X_3$$

من نموذج الانحدار المقدر السابق، يتضح لنا:

▪ الجزء الثابت (β_0) : نجد أنه يساوي (4.421).

▪ معامل الانحدارات

○ (β_1) تساوي 0.345.

○ (β_2) تساوي -1.367.

○ (β_3) تساوي 0.209.

ثانياً: الشروط النظرية.

١) اتفاق (أو منطقية) إشارات وقيمة معاملات الانحدار :

يلاحظ هنا أن الظاهرة محل الدراسة لم تكن هناك قيوداً محددة سواء حول إشارات أو معاملات الانحدار، وبالتالي فإننا ننتقل إلى المرحلة التالية من مراحل فحص نموذج الانحدار الجيد.

٢) القدرة التفسيرية للنموذج :

بالرجوع إلى الجدول الذي يتضمن النتائج الخاصة بمعامل التحديد في صفحة المخرجات، نجد أن معامل التحديد المعدل يساوي 65.2 % ، وهذا معناه أن المتغيرات المستقلة (X_1, X_2, X_3) تفسر 65.2 % من التغييرات التي تحدث في المتغير التابع (Y)، والباقي 34.8 % يرجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي.

ثالثاً: الشروط الرياضية.

١) المعنوية الكلية للنموذج :

▣ الفروض الإحصائية:

الفرض العدmi (H_0): نموذج الانحدار غير معنوي.

الفرض البديل (H_1): نموذج الانحدار معنوي.

▣ الفروض بشكل آخر:

الفرض العدmi (H_0): جميع معاملات الانحدار غير معنوية
(لا تختلف عن الصفر).

الفرض البديل (H_1): واحد على الأقل من معاملات الانحدار معنوية
(تختلف عن الصفر).

▣ تفريغ النتائج والتعليق عليها:

التعليق:

يتضح من جدول تحليل التباين المبين في الصفحة التالية: أن قيمة الاحتمال P.Value تساوى صفر، وهي أقل من مستوى المعنوية 5 %، وبالتالي فإننا نرفض الفرض العدmi القائل بأن نموذج الانحدار غير معنوي، ومن ثم فإن هناك واحد على الأقل من معاملات الانحدار تختلف عن الصفر.

جدول تحليل التباين ANOVA

لنموذج الانحدار المتعدد

P. Value	ف المحسوبة F_{cal}	متوسط المربعات MS	مجموع المربعات SS	درجات الحرية DF	المصدر Source
0.000	12.874	2.292	6.877	3	الانحدار
◦	◦	0.178	2.849	16	الخطأ
◦	◦	*	9.726	19	الكلي

2) المعنوية الجزئية للنموذج :

▣ شكل الفروض الإحصائية:

أ- بالنسبة لـ (B_0) :

$$H_0: B_0 = 0$$

$$H_1: B_0 \neq 0$$

ب- بالنسبة لـ (B_1) :

$$H_0: B_1 = 0$$

$$H_1: B_1 \neq 0$$

ج- بالنسبة لـ (B_2) :

$$H_0: B_2 = 0$$

$$H_1: B_2 \neq 0$$

د- بالنسبة لـ (B_3) :

$$H_0: B_3 = 0$$

$$H_1: B_3 \neq 0$$

▣ تفريغ النتائج والتعليق عليها:

نتائج اختبار معنوية معاملات

الانحدار المتعدد

P. Value	قيمة إحصائي الاختبار (ت)	قيمة معاملات الانحدار	المعاملات
0.000	11.895	4.421	B_0
0.365	0.931	0.345	B_1
0.000	-5.545	-1.367	B_2
0.001	3.854	0.209	B_3

التعليق:

بالنسبة لـ (B_0) : نجد أن قيمة الاحتمال P.Value تساوى صفر، وهي أقل من مستوى المعنوية 5 %، وبالتالي فإننا نرفض الفرض العدلي القائل بأن المدار الثابت في نموذج الانحدار غير معنوي.

و بالنسبة لـ (B_1) : نجد أن قيمة الاحتمال P.Value تساوى 0.365 وهي أكبر من مستوى المعنوية 5 % ، وبالتالي فإننا نقبل الفرض العددي القائل بأن معامل (B₁) في نموذج الانحدار المقدر غير معنوي.

و بالنسبة لـ (B_2) : نجد أن قيمة الاحتمال P.Value تساوى صفر، وهي أقل من مستوى المعنوية 5 % ، وبالتالي نرفض الفرض العددي القائل بأن معامل (B₂) في نموذج الانحدار المقدر غير معنوي.

و بالنسبة لـ (B_3) ، نجد أن قيمة الاحتمال P.Value تساوى 0.001 ، وهي أقل من مستوى المعنوية 5 % ، وبالتالي نرفض الفرض العددي القائل بأن معامل (B₃) في نموذج الانحدار المقدر غير معنوي.

٣) شروط المربعات الصغرى العادلة.

الشرط الأول: اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي Normality Test

▣ الفرض الإحصائية:


الفرض العددي (H_0): البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.

الفرض البديل (H_1): البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي.

ويتم دراسة اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي بطريقتين:

الطريقة الأولى: بيانيا

وذلك من خلال فحص الشكل البياني للعلاقة بين الاحتمال التجمييعي المشاهد والاحتمال التجمييعي المتوقع للبواقي المعيارية.



وكما هو موضح بالشكل السابق: نجد أن البواقي تتوزع بشكل عشوائي على جانبي الخط، مما يعني أن البواقي تتوزع توزيعاً معتدلاً (أي تتابع التوزيع الطبيعي).

الطريقة الثانية: حسابيا باستخدام اختبار كل من اختبار (كلومجروف - سيمزوف)، وختبار (شاپيرو - ويلك):

الخطوات

(1) افتح قائمة Analyze ومن القائمة الفرعية **Descriptive**

سيظهر لنا المربع الحواري التالي:



: (2)


Standardized Residual -

.Dependent List

.Plots Display -

Plots.. -

:



: : (3)

Normality Plots with tests

.None Boxplots

Stem – and – Leaf

Continue

OK (4)

:Output

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Standardized Residual	.166	20	.149	.929	20	.189

a. Lilliefors Significance Correction

□ تفريغ النتائج والتعليق:

نتائج اختبار اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي

P. value	درجات الحرية	إحصائي الاختبار	بيان
0.149	20	0.166	اختبار كلومجروف – سيمرنوف
0.189	20	0.929	اختبار ويلك – شابيرو

□ طريقة التعليق:

يتضح من نتائج التحليل الإحصائي أن قيمة P.Value أكبر من مستوى المعنوية 0.05 في كلا الاختبارين، ومن ثم فإننا نقبل الفرض العددي القائل بأن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي، وهو ما يدعم النتيجة التي توصلنا إليها من خلال الرسم البياني. وبالتالي فإن الشرط الأول [شرط اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي] من شروط استخدام طريقة المربعات الصغرى العادلة متوافر.

الشرط الثاني: الاستقلال الذاتي للبواقي:

□ الفروض الإحصائية:

الفرض العددي (H_0): يوجد استقلال بين البواقي (لا يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي).

الفرض البديل (H_1): لا يوجد استقلال بين البواقي (يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي).

■ أداة الحكم :

يتم الحكم على مدى وجود استقلال ذاتي بين البواقي من خلال اختبار

. Durbin – Watson Test

■ خطوات تنفيذ الاختبار :

الخطوة الأولى : حساب إحصائي الاختبار (DW) :

من جدول المخرجات الخاص بمعامل التحديد وإحصائي اختبار داربن – واتسون،
نجد أن قيمة (DW) تساوي (1.488).

الخطوة الثانية : إيجاد القيمة الحرجية (وذلك من جدول القيم الحرجية لـ

: Durbin – Watson

وهنا نجد أن القيم الحرجية عند $k = 3$ ، $n = 16$ كما يلي :

$$d_L = 0.86$$

$$d_u = 1.73$$

الخطوة الثالثة : اتخاذ القرار :

اتخاذ القرار بشأن قبول أو رفض الفرض العددي بشأن الارتباط الذاتي للبواقي، يتم
وفقاً للقواعد الآتية :

1) نرفض الفرض العددي في حالتين :

الحالة الأولى : إذا كان $(4 - d_L) < DW < 4)$

الحالة الثانية : إذا كان $(0 < DW < d_L)$.

2) ونقبل الفرض العدمي في هاتين:

الحالة الأولى: إذا كان ($d_u < DW < 4 - d_u$).

الحالة الثانية: إذا كان ($d_u < DW < 2$).

3) هذا بالإضافة إلى أنه هناك حالتين يكون فيهما القرار غير محدد، بمعنى

أننا لا نستطيع تحديد هل يوجد ارتباط ذاتي أم لا:

الحالة الأولى: ($4 - d_u < DW < 4 - d_L$).

الحالة الثانية: عندما ($d_L < DW < d_u$).

وهنا نجد أن: $d_u < DW < d_L$ ، حيث ($0.86 < DW < 1.73$). وبالتالي -

وفقا لاختبار (داربن – واتسون) – لم نصل إلى قرار محدد بشأن الارتباط الذاتي

للبوافي. لذا يتعين البحث عن أسلوب أو اختبار آخر خلاف هذا الاختبار.

الشرط الثالث : اختبار تجانس البوافي (اختبار ثبات التباين):

يتم الحكم على مدى تجانس أو ثبات تباين الأخطاء بطريقتين:

الطريقة الأولى: من خلال الرسم البياني:


وذلك من خلال فحص شكل انتشار البوافي المعيارية مع القيم الاتجاهية للمتغير

التابع.


الخطوات:

1) افتح قائمة Scatter Graphs واختر Scatter سوف يظهر المربع الحواري

التالي:



في هذا المربع الحواري: أنقر مرة واحدة بالماوس فوق **Simple**، ثم أنقر فوق **Define** سيظهر المربع الحواري التالي:




في هذا المربع الحواري:
أ- قم بنقل المتغير الخاص بالقيم المعيارية للبواقي **Standard** **Y Axis residual [zre_1]**.

بــ قم ببنقل المتغير الخاص بالقيمة المتوقعة (الاتجاهية) للمتغير

Unstandardized Predicted Value التابع

.X Axis [pre_1] إلى المربع الذي بعنوان

(2) ثم اضغط ok سوف نحصل على الشكل البياني التالي في صفحة المخرجات:



يلاحظ هنا أن:

انتشار وتوزيع الباقي يأخذ شكل عشوائي على جانبي الخط الذي يمثل الصفر (وهو الخط الذي يفصل بين الباقي السالبة والباقي الموجبة)، حيث أنه لا يمكننا رصد نمط أو شكل معين لتباين هذه الباقي ، وهو ما يعني أن هناك تجانس أو ثبات في تباين الأخطاء. وبالتالي فإن الشرط الثالث [شرط ثبات التباين للباقي] من


شروط استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية متوافر. ولزيادة التأكيد سوف نقوم بتطبيق طريقة Goldfield – Quandt لاختبار ثبات التباين.

الطريقة الثانية: الطريقة الحسابية (طريقة Goldfield – Quandt)

الخطوات:

١. يتم ترتيب المشاهدات ترتيبا تصاعديا أو تنازليا وفقا لأحد المتغيرات المستقلة.

أ. افتح قائمة Data واختر Sort Cases سوف يظهر المربع الحواري التالي:



ب. في هذا المربع الحواري: قم بنقل المتغير المستقل (x_3) إلى المربع الذي بعنوان Sort by. ولاحظ هنا أن الاختيار الافتراضي لطريقة ترتيب المشاهدات Ascending هي الترتيب التصاعدي (سنترکه كما هو).

ت. اضغط **ok**، ستجد انه قد تم ترتيب المشاهدات ترتيبا تصاعديا (الأصغر فالأكبر) وفقا للمتغير المستقل (x_3)، كما هو موضح بالشكل التالي:

	y	x1	x2	x3	
1	4.30	.387	.882	1.990	
2	3.30	.465	1.020	2.000	
3	4.50	.368	.110	2.000	
4	4.40	1.350	.993	2.010	
5	3.90	.373	.889	2.500	
6	4.32	.661	.170	3.290	
7	4.20	1.140	.794	3.770	
8	5.04	.665	.172	3.790	
9	5.00	.737	.160	3.940	
10	5.00	.508	.358	4.240	
11	5.50	.901	.188	4.420	
12	4.96	.627	.350	4.650	
13	6.00	.653	.164	4.910	
14	5.80	.683	.168	5.000	
15	6.02	.596	.156	5.040	
16	5.10	.308	.720	6.120	
17	4.10	.889	1.320	6.420	
18	4.30	.508	.995	6.940	
19	5.20	.447	.927	6.970	
20	4.70	.546	.898	8.110	
21					

2. يتم استبعاد 20% من المشاهدات في المنتصف، أي أننا سوف نستبعد 4 مشاهدات من المنتصف¹. والمشاهدات التي سيتم استبعادها هي المشاهدة رقم(9)، (10)، (11)، (12). في هذه الحالة سيكون لدينا سلسلتين، كل سلسلة ستضم 8 مشاهدات: السلسلة الأولى تضم المشاهدات رقم (1)،

$$\text{مشاهدة } 4 = 0.20 \times 20)^1$$


(2) إلى المشاهدة رقم (8)، والسلسلة الثانية وتضم المشاهدات رقم

(13)، (14) إلى المشاهدة رقم (20).


3. ثم نقوم بحساب مجموع مربعات الخطأ (SSE) لكل سلسلة من السلاسلتين، وذلك من جدول تحليل التباين لمعادلة الانحدار لكل سلسلة. وفيما يلي الخطوات بالتفصيل:

أ. يتم الإبقاء على المشاهدات الخاصة بالسلسلة الأولى واستبعاد باقى المشاهدات، كما يلى :

○ افتح قائمة Data واختر Select Cases سوف يظهر المربع الحواري التالي :



○ في المربع الحواري الذي أمامك: انقر أمام طريقة الاختيار Based on time or case range ثم انقر فوق سوف يظهر المربع الحواري التالي:



- في المربع الحواري الذي أمامك: قم بإدخال بداية ونهاية رقم المشاهدات التي سيتم الإبقاء عليها. ثم اضغط **Continue** للعودة للمربع الحواري السابق، ثم اضغط **Ok**، ستجد أن البرنامج قد أبقى على المشاهدات الثمانية الأولى فقط واستبعد باقي المشاهدات، كما هو موضح بالشكل التالي:

	y	x1	x2	x3	
1	4.30	.387	.882	1.990	
2	3.30	.465	1.020	2.000	
3	4.50	.368	.110	2.000	
4	4.40	1.350	.993	2.010	
5	3.90	.373	.889	2.500	
6	4.32	.661	.170	3.290	
7	4.20	1.140	.794	3.770	
8	5.04	.665	.172	3.790	
9	5.00	.737	.160	3.940	
10	5.00	.508	.358	4.240	
11	5.50	.901	.188	4.420	
12	4.96	.627	.350	4.650	
13	6.00	.653	.164	4.910	
14	5.80	.683	.168	5.000	
15	6.02	.596	.156	5.040	
16	5.10	.308	.720	6.120	
17	4.10	.889	1.320	6.420	
18	4.30	.508	.995	6.940	
19	5.20	.447	.927	6.970	
20	4.70	.546	.898	8.110	
21					


ب. ثم تقوم بعد ذلك بتنفيذ خطوات إيجاد نموذج انحدار (y) على (x 's) للسلسلة الأولى. ومن مخرجات هذا التحليل، سوف نهتم بجدول تحليل التباين التالي:

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.022	3	.341	1.889	.273 ^a
Residual	.721	4	.180		
Total	1.744	7			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
 b. Dependent Variable: Y

من هذا الجدول نجد أن: مجموع مربعات الخطأ₍₁₎ (SSE) للسلسلة الأولى تساوي (0.721).

ج. وبنفس الأسلوب يتم إيجاد مجموع مربعات الخطأ₍₂₎ (SSE) للسلسلة الثانية كما يلي:



m regression - SPSS Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Window Help

1 : y 4.3

	y	x1	x2	x3	
1	4.30	.387	.882	1.990	
2	3.30	.465	1.020	2.000	
3	4.50	.368	.110	2.000	
4	4.40	1.350	.993	2.010	
5	3.90	.373	.889	2.500	
6	4.32	.661	.170	3.290	
7	4.20	1.140	.794	3.770	
8	5.04	.665	.172	3.790	
9	5.00	.737	.160	3.940	
10	5.00	.508	.358	4.240	
11	5.50	.901	.188	4.420	
12	4.96	.627	.350	4.650	
13	6.00	.653	.164	4.910	
14	5.80	.683	.168	5.000	
15	6.02	.596	.156	5.040	
16	5.10	.308	.720	6.120	
17	4.10	.889	1.320	6.420	
18	4.30	.508	.995	6.940	
19	5.20	.447	.927	6.970	
20	4.70	.546	.898	8.110	
21					

Data View Variable View SPSS Processor is ready

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.600	3	1.200	14.373	.013 ^a
Residual	.334	4	8.350E-02		
Total	3.934	7			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

إذا مجموع مربعات الخطأ (SSE) للسلسلة الثانية تساوي (0.334).

د. ثم يتم حساب قيمة (\hat{F}) المحسوبة، كما يلى:


$$\hat{F} = \frac{(SSE)_2}{(SSE)_1} = \frac{0.334}{0.721} = 0.4632$$

٥. وهنا نجد أن قيمة (\hat{F}) المحسوبة تساوى 0.4632 وهى أقل من القيمة الجدولية $F_{(8,8,0.05)}$ التي تساوى 3.44 ، إذا نقبل الفرض العدمي القائل بأن هناك تجانس أو ثبات في تباين الأخطاء. وهو ما يتفق مع النتيجة التي توصلنا إليها من الرسم البياني.

الشرط الرابع : شرط عدم الإزدواج الخطى بين المتغيرات التفسيرية (المستقلة) :

أولاً: باستخدام معامل تضخم التباين (VIF)

نحصل على قيم هذا المعامل من جدول المعاملات Coefficients في صفحة المخرجات، كما هو موضح بالشكل التالي:



Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.421	.372	11.895	.000		
	X1	.345	.370	.128	.931	.365	.976
	X2	-1.367	.247	-.767	-5.545	.000	.955
	X3	.209	.054	.536	3.854	.001	.946

a. Dependent Variable: Y

تفریغ النتائج والتعليق:

Tolerance	VIF	المتغير
0.976	1.025	X1
0.955	1.047	X2
0.946	1.057	X3

طبقاً للنتائج الموضحة في الجدول السابق:

نجد أن جميع قيم هذا المعامل أقل من (5)، وبالتالي لا يوجد ازدواج خطى بين المتغيرات المستقلة.

ملحوظة هامة جداً: معامل Tolerance هو مقلوب (VIF) أي أن


$$VIF = \frac{1}{Tolerance}$$

ثانياً: مصفوفة الارتباط Correlation Matrix

الخطوات:

(1) افتح قائمة Analyze ومن الأمر Bivariate Correlate اختر

سوف يظهر المربع الحواري التالي:



في هذا المربع الحواري: قم بنقل المتغيرات المستقلة (X_1, X_2, X_3) إلى المربع الذي بعنوان **Variables**، ثم اضغط **ok**، ستحصل على مصفوفة الارتباط التالية:

Correlations

		X1	X2	X3
X1	Pearson Correlation	1.000	.071	-.122
	Sig. (2-tailed)	.	.765	.608
	N	20	20	20
X2	Pearson Correlation	.071	1.000	.188
	Sig. (2-tailed)	.765	.	.427
	N	20	20	20
X3	Pearson Correlation	-.122	.188	1.000
	Sig. (2-tailed)	.608	.427	.
	N	20	20	20

يتضح مما سبق:

أن جميع معاملات الارتباط أقل من (0.70)، هذا بالإضافة إلى عدم معنوية معاملات الارتباط في الحالات الثلاثة، وبالتالي نستطيع أن القول بأنه لا توجد مشكلة للازدواج الخطى في نموذج الانحدار المقدر.

الفصل التاسع

التحليل العائلي

Factor Analysis

التحليل العائلي

Factor Analysis

مراحل تنفيذ التحليل العائلي:

المراحل الأولى: فحص مصفوفة الارتباط:

يقصد بها التأكيد من أنه لا يوجد متغيرات في مصفوفة الارتباط له معامل ارتباط مع

كل أو معظم المتغيرات:

- أ. قيمته تساوي ($1 \pm$) ، (الارتباط القائم).
- ب. أو تساوي الصفر ، (عدم وجود ارتباط).
- ج. أو أقل من 0.25 بصرف النظر عن الإشارة¹ ، (ارتباط ضعيف جداً).
- د. أو أكبر من 0.90 بصرف النظر عن الإشارة ، (ارتباط عال جداً).

وفي حالة وجود متغير تتوافر فيه أيًا من الشروط الأربعة السابقة يتم حذفه قبل إجراء التحليل.

المراحل الثانية: التأكيد من عدم وجود مشكلة الا زدواج الخطى:

Multi-Collinearity

على الرغم من أن الهدف من توافر الشرط الأول والرابع في المراحل السابقة هو تفادي مشكلة الا زدواج الخطى ، إلا أنه قد نجد أن المشكلة ما زالت قائمة.

وبصفة عامة، يتم الحكم على وجود أو عدم وجود مشكلة الازدواج الخطى من خلال إيجاد محدد مصفوفة الارتباط . فإذا كانت قيمة هذا المحدد أكبر من 0.00001 (واحد من مائة ألف)، هنا نحكم بعدم وجود مشكلة للازدواج الخطى بين المتغيرات. أما إذا كانت قيمته أقل من 0.00001 ، في هذه الحالة نقوم باستبعاد المتغيرات التي لها معامل ارتباط أكبر 0.80 (بصرف النظر عن الإشارة). (راجع في ذلك Andy Field).

المرحلة الثالثة: مدى كفاية حجم العينة:
كما سبق وأن أشرنا إلى أن التحليل العاملي يعتمد على هيكل الارتباطات بين المتغيرات، ومن المعروف أن قيمة معامل الارتباط تتأثر بحجم العينة، فإن نتائج التحليل العاملي ومدى الاعتمادية على العوامل التي يستخلصها التحليل في تلخيص البيانات سوف تتوقف – أيضاً – على حجم العينة.

وبصفة عامة، يتم الحكم على مدى كفاية حجم العينة من خلال اختبار KMO .test

المرحلة الرابعة: استخلاص العوامل وتفسير النتائج:

مثال عملي:

بفرض أننا نريد إجراء التحليل العاملي Factor Analysis لمجموعة متغيرات الموضحة بالشكل التالي:


The screenshot shows the SPSS Data Editor window titled "factor osama - SPSS Data Editor". The menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations and data manipulation. The main area displays a data table with 18 rows and 12 columns. The columns are labeled x1 through x11. The first row contains the labels x1 through x9. The second row contains the value 9.4. The data values range from 2.000 to 15.000. The bottom of the window shows tabs for "Data View" and "Variable View", with "Data View" selected. A status bar at the bottom right indicates "SPSS Processor is ready".

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11
1	2.000	1.600	2.400	3.90	20.00	11.20	27.20	6.000	11.28	12.06	3.600
2	3.000	2.400	3.600	5.85	25.00	14.00	15.00	5.000	9.400	10.05	3.000
3	5.000	1.000	2.520	9.75	24.00	9.000	32.64	2.000	3.760	4.020	5.000
4	10.000	8.000	12.000	8.00	6.000	3.360	8.160	11.00	20.68	22.11	6.600
5	2.000	12.00	2.400	3.90	10.00	5.600	13.60	14.00	6.000	14.00	8.400
6	4.000	3.200	4.800	7.80	24.00	13.44	32.64	2.000	3.760	4.020	1.200
7	11.000	8.800	3.000	21.5	30.00	10.00	19.00	7.000	13.16	14.07	4.200
8	15.000	3.000	18.000	12.0	11.00	6.160	14.96	3.000	8.000	36.18	2.000
9	14.000	11.20	16.800	27.3	5.000	2.800	6.800	20.00	37.60	40.20	12.000
10	16.000	12.80	19.200	31.2	18.00	10.08	24.48	16.00	30.08	32.16	9.600
11	5.000	4.000	22.000	9.75	14.00	7.840	19.04	14.00	26.32	28.14	8.400
12	8.000	12.00	9.600	6.00	29.00	3.000	3.000	12.00	22.56	24.12	15.000
13	7.000	5.600	8.400	13.7	7.000	3.920	9.520	30.00	14.00	10.00	18.000
14	13.000	2.000	6.000	7.00	3.000	8.000	4.080	40.00	75.20	80.40	24.000
15	12.000	9.600	14.400	23.4	18.00	10.08	24.48	5.000	9.400	10.05	3.000
16	4.000	3.200	4.800	25.0	46.00	4.000	15.00	70.00	9.400	8.000	2.000
17											
18											

الخطوات:


1. افتح قائمة **Analyze** ، ومن القائمة الفرعية لـ **Data Reduction** ،

اختر الأمر **Factor** ، سوف يظهر المربع الحواري التالي :



2. في المربع الحواري الذي أمامك:
قم بنقل جميع المتغيرات (x_{11} x_2 , x_1) إلى المربع الذي
يُعنون **Variables**.

3. ثم أنقر فوق الاختيار **Descriptives**، سوف يظهر المربع الحواري
التالي:



- في هذا المربع الحواري:
من الاختيارات الخاصة بمصفوفة الارتباط **Correlation Matrix** أنقر
بالماوس أمام:

أ. الأمر **Coefficients**: لإظهار معاملات الارتباط بين المتغيرات

التي تم إدخالها في التحليل.

ب. الأمر **P.Value Significance Levels**: وذلك لإظهار

للحكم على معنوية معاملات الارتباط.

ج. الأمر **Determinant**: لإظهار قيمة مُحدد مصفوفة الارتباط.

د. الأمر **KMO and Bartlett's test of sphericity**

لإظهار نتائج اختبار كل من:

○ KMO test : للحكم على مدى ملائمة حجم العينة.


○ Bartlett's test : لاختبار هل مصفوفة الارتباط هي

مصفوفة الوحدة أم لا.

5. ثم اضغط **Continue** للعودة إلى المربع الحواري الأساسي.

4. ثم من المربع الحواري الأساسي: أنقر فوق الاختيار **Extraction**

سوف يظهر المربع الحواري التالي:



في هذا المربع الحواري: سوف نقوم بتنفيذ ما يلي:
أ. من الاختيارات Method سوف نختار طريقة الاستخلاص

. Principal components

ب. ومن الأمر Display سوف نختار solution

ملحوظة:

♦ تتمثل أهمية الأمر (Display) في أنه يوضح التحسن في التفسير بسبب التدوير Rotation، بحيث إذا كان الحل بعد التدوير (solution) لا يختلف بدرجة كافية عن الحل قبل التدوير، هذا يلفت نظراً إلى ضرورة تغيير إما طريقة استخلاص العوامل Extraction أو مبدأ Principle لأن نختار طريقة أخرى خلاف Method أو اختيار أسلوب آخر للتدوير خلافاً لطريقة Component .Varimax

♦ كما نود الإشارة إلى أننا لم نختار Scree plot نظراً لصعوبة تفسير النتائج مع هذا الاختيار.


ج. ومن الأمر Extract سوف نختار Eigenvalues over المربع الصغير الذي أمام هذا الاختيار نكتب القيمة (1). وسوف نفسر معنى هذه القيمة عند شرح وتحليل النتائج.

ملحوظة:

لو كنا نريد عدد محدد من العوامل، كنا سنختار **Number of factors** بدلاً من **Eigenvalues over**.

د. ثم اضغط **Continue** للعودة إلى المربع الحواري الأساسي.

5. ومن المربع الحواري الأساسي: أنقر فوق الاختيار **Rotation**، سوف يظهر المربع الحواري التالي:



من هذا المربع الحواري: سوف نقوم بتنفيذ ما يلي:
أ. نختار إحدى طرق التدوير **Extraction** التي يوفرها برنامج **SPSS**.

وهنا نود الإشارة إلى أن طرق التدوير تنقسم إلى :

❖ طرق التدوير المتعامد **Orthogonal Rotation**: ومن أمثلة هذه الطرق:

◦ طريقة Varimax

◦ طريقة Quartimax

◦ طريقة Equamax

❖ ثم طرق التدوير المائل Oblique Rotation: مثال ذلك:


◦ طريقة Direct Oblimin

◦ طريقة Promax

وبصفة عامة يتوقف اختيار أسلوب معين للتدوير سواء المتعامد أو المائل يتوقف على مدى اعتقاد الباحث بوجود ارتباط بين العوامل (وليس المتغيرات) من عدمه. ففي حالة افتراض عدم وجود ارتباط بين العوامل (أي أن العوامل مستقلة) هنا يختار الباحث إحدى طرق التدوير المتعامد. أما في حالة افتراض ويدعمه أساس نظري بوجود ارتباط بين العوامل، في هذه الحالة يختار الباحث إحدى طرق التدوير المائل.

ب. ثم اضغط Continue للعودة إلى المربع الحواري الأساسي.

6. ومن المربع الحواري الأساسي: انقر فوق الاختيار Options، سوف يظهر المربع الحواري التالي:



في هذا المربع الحواري:

- أ. انقر أمام الاختيار **Sorted by size**
 - ب. ثم انقر أمام الاختيار **Suppress absolute value less than:**، ثم في الخانة التي أمام هذا الاختيار أدخل القيمة **.35**.
 - ج. ثم اضغط **Continue** للعودة إلى المربع الحواري الأساسي.
7. ومن المربع الحواري الأساسي: اضغط **OK**، ستحصل على نتائج التحليل العائلي في صفحة المخرجات، وفيما يلي شرح لمعنى أهم الجداول:

تفسير النتائج

أولاً: جدول مصفوفة الارتباط :Correlation Matrix

يتكون هذا الجدول من جزعين:

الجزء الأول (العلوي): يتضمن معاملات ارتباط بيرسون **Correlation**، **والجزء الثاني (السفلي)** يتضمن قيمة الاحتمال لمعنى معاملات الارتباط (من طرف واحد) **.Sig (1 – tailed)**

Correlation Matrix^a

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11
Correlation	X1	1.000	.398	.622	.588	-.386	-.226	-.281	-.021	.501	.810
	X2	.398	1.000	.334	.427	-.146	-.380	-.313	-.095	.069	.038
	X3	.622	.334	1.000	.432	-.384	-.271	-.156	-.085	.258	.359
	X4	.588	.427	.432	1.000	.187	-.134	.072	.314	.084	.030
	X5	-.386	-.146	-.384	.187	1.000	.231	.343	.231	-.475	-.551
	X6	-.226	-.380	-.271	-.134	.231	1.000	.710	-.459	-.205	-.233
	X7	-.281	-.313	-.156	.072	.343	.710	1.000	-.418	-.542	-.553
	X8	-.021	-.095	-.085	.314	.231	-.459	-.418	1.000	.362	.252
	X9	.501	.069	.258	.084	-.475	-.205	-.542	.362	1.000	.928
	X10	.810	.038	.359	.030	-.551	-.233	-.553	.252	.928	1.000
	X11	.294	.199	.102	-.088	-.525	-.433	-.656	.344	.789	.682
Sig. (1-tailed)	X1		.063	.005	.008	.070	.200	.146	.469	.024	.006
	X2			.103	.050	.295	.073	.119	.364	.400	.445
	X3				.047	.071	.155	.282	.377	.167	.086
	X4					.244	.310	.395	.118	.379	.455
	X5						.195	.096	.195	.032	.013
	X6							.001	.037	.223	.192
	X7								.054	.015	.013
	X8									.084	.173
	X9										.000
	X10										
	X11										

^a. Determinant= 3.133E-05

التعليق على النتائج:

يلاحظ هنا أن مصفوفة الارتباط لا يوجد بها متغيرات لها معامل ارتباط مع كل أو معظم المتغيرات:

1. قيمته تساوي ($1 \pm$).

2. أو تساوي الصفر.

3. أو أقل من 0.25 بصرف النظر عن الإشارة.¹

4. أو أكبر من 0.90 بصرف النظر عن الإشارة.

إذا لسنا في حاجة إلى حذف أيًا من المتغيرات الحالية.

ثانياً : جدول نتائج اختبار كل من KMO and Bartlett's Test

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.549
Bartlett's Test of Sphericity	108.896
df	55
Sig.	.000

الاختبار الأول: اختبار KMO Test

كما سبق وأن أشرنا ، أنه من خلال هذا الاختبار يتم الحكم على مدى كفاية حجم العينة. وبصفة عامة، تتراوح قيمة إحصائي اختبار KMO بين الصفر والواحد الصحيح. وكلما اقتربت قيمته من الواحد الصحيح كلما دل ذلك على زيادة

الاعتمادية Reliability للعوامل التي نحصل عليها من التحليل، والعكس صحيح. ويشير هنا صاحب هذا الاختبار (Kaiser 1974) إلى أن الحد الأدنى المقبول لهذا الإحصائي هي 0.50 حتى يمكن الحكم بكفاية حجم العينة. أما في حالة أن تكون قيمته أقل من ذلك، فإنه يتبع زيارة حجم العينة.

التعليق على النتائج:

ومن النتائج الموضحة في الجدول السابق، نجد أن قيمة إحصائي اختبار KMO تساوي 0.549 أي أكبر من الحد الأدنى الذي اشترطه Kaiser. إذا يمكننا أن نحكم بكفاية حجم العينة في التحليل الحالي.

الاختبار الثاني: اختبار بارتليت Bartlett's Test

الهدف من هذا الاختبار هو تحديد ما إذا كانت مصفوفة الارتباط Correlation هي مصفوفة الوحدة¹ أم لا. بمعنى أنه يختبر الفرض التالية:

الفرض العددي: مصفوفة الارتباط هي مصفوفة الوحدة.

1

(3 3)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

الفرض البديل: مصفوفة الارتباط ليست مصفوفة الوحدة.

تفریغ النتائج:

الاحتمال P.Value	درجات الحرية df	إحصائي الاختبار χ^2
0.000	55	108.896

التعليق:

ومن النتائج الموضحة في الجدول السابق، نجد أن قيمة الاحتمال P.Value تساوى الصفر أي أقل من مستوى المعنوية 5٪، إذا نرفض الفرض العددي ونقبل الفرض البديل، وبالتالي مصفوفة الارتباط ليست مصفوفة الوحدة.

مشكلة الازدواج الخطى : Multi-Collinearity

كما سبق وأن أشرنا إلى أنه يتم الحكم على وجود أو عدم وجود مشكلة الازدواج الخطى من خلال إيجاد محدد مصفوفة الارتباط. وهنا نجد أن قيمة هذا المحدد تساوى 0.000031 أي أكبر من 0.00001 (واحد من مائة ألف)

لذا فإننا نحكم بعدم وجود مشكلة للازدواج الخطى بين المتغيرات. وأيضاً لنحتاج إلى حذف متغيرات.

ملحوظة هامة:

1. كون مصفوفة الارتباط مصفوفة الوحيدة هذا يعني أنه لا توجد علاقة ارتباط بين المتغيرات حيث أن معامل الارتباط بين جميع المتغيرات يساوي الصفر.
2. هذا الاختبار يعتبر مكملاً للشرط الخاص بـألا يكون هناك متغير معامل الارتباط بينه وبين معظم أو كل المتغيرات يساوي صفر، ولكن الفرق بينهما يكمن في أن اختبار بارتليت يكون بشكل إجمالي للمصفوفة ككل.

ثالثاً : جدول التباين الكلي المفسر Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.436	40.323	40.323	4.436	40.323	40.323	3.396	30.876	30.876
2	2.019	18.357	58.680	2.019	18.357	58.680	2.361	21.461	52.337
3	1.651	15.013	73.693	1.651	15.013	73.693	2.046	18.600	70.936
4	1.200	10.911	84.604	1.200	10.911	84.604	1.503	13.668	84.604
5	.846	5.873	90.477						
6	.364	3.306	93.783						
7	.300	2.726	96.509						
8	.176	1.600	98.108						
9	.134	1.222	99.330						
10	5.410E-02	.492	99.822						
11	1.958E-02	.178	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

يتكون هذا الجدول من 3 أجزاء:

الجزء الأول: الجذور الكامنة المبدئية Initial Eigenvalues، كما هو موضح

بالشكل التالي:

Initial Eigenvalues		
Total	% of Variance	Cumulative %
4.436	40.323	40.323
2.019	18.357	58.680
1.651	15.013	73.693
1.200	10.911	84.604
.646	5.873	90.477
.364	3.306	93.783
.300	2.726	96.509
.176	1.600	98.108
.134	1.222	99.330
5.410E-02	.492	99.822
1.958E-02	.178	100.000

في هذا الجزء يتم عرض الحل المبدئي من خلال افتراض عدد من العوامل يساوي عدد المتغيرات التي تم إدخالها.

ويتضمن هذا الجزء البيانات التالية لكل عامل من هذه العوامل:

1. **عمود Total** : يتضمن هذا العمود الجذور الكامنة لكل عامل، مع

ملاحظة أن مجموع هذا العمود لابد وأن يساوي عدد المتغيرات، أي

أن:

$$4.436 + 2.019 + 1.651 + \dots + 0.01958 = 11$$

2. **عمود % of Variance** : نسبة التباين الذي يفسره كل عامل،

ويتم حسابه كما يلي:

نسبة التباين لأي عامل = $(\text{مجموع الجذور الكامنة لهذا العامل} \div \text{عدد المتغيرات}) \times 100$.

فمثلا، نسبة التباين الذي يفسره العامل الأول = $(11 \div 4.43559) \times 40.323 = 100$.

ملحوظة :

الأرقام الظاهرة في الجدول تكون مقربة إلى أقرب 3 أرقام عشرية. وللتتأكد يمكنك العودة لصفحة المخرجات وعمل ضغط مزدوج على الجدول ثم ضغط مزدوج على أي قيمة في الجدول سوف تظهر القيمة كاملة بدون تقرير.

عمود Cumulative % : نسبة التباين التراكمي أو التجمعي، .3

وهي عبارة عن المجموع الصاعد لعمود نسبة التباين %

.Variance

الجزء الثاني: مجموع مربعات التحميلات المستخلصة [قبل التدوير] Extraction

: Sums of Squared Loadings ، كما هو موضح بالشكل التالي:


Extraction Sums of Squared Loadings		
Total	% of Variance	Cumulative %
4.436	40.323	40.323
2.019	18.357	58.680
1.651	15.013	73.693
1.200	10.911	84.604

يتضمن هذا الجزء نفس البيانات الموجودة في الجزء السابق ، ولكن للعوامل التي تم استخلاصها فقط. وهي العوامل التي تكون مجموع الجذور الكامنة Total

أكبر من الواحد الصحيح. لذا نجد أنه يظهر العوامل الأربع الأولى فقط وتم استبعاد باقي العوامل.

السؤال هنا الآن: لماذا الواحد الصحيح؟

لو رجعنا إلى المربع الحواري الفرعى (Extraction) الذي يتضمن الأوامر الخاصة بشرط استخلاص العوامل (الموضح بالشكل التالي)، سنجد أننا قد طلبنا من البرنامج أن يتم استخلاص العوامل التي يزيد الجذور الكامنة لها عن الواحد الصحيح.



الجزء الثالث: مجموع مربعات التحميلات بعد التدوير ، الموضح بالشكل التالي: Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings		
Total	% of Variance	Cumulative %
3.396	30.876	30.876
2.361	21.461	52.337
2.046	18.600	70.936
1.503	13.668	84.604

أيضا يتضمن هذا الجدول نفس البيانات الموجودة في الجزء الثاني للعوامل الأربع التي تم استخلاصها، ولكن هذه المرة بعد التدوير **Rotation** أي بعد تطبيق الأسلوب الذي اختربناه للتدوير وهو أسلوب **Varimax**.

وهنا نجد الإشارة إلى أمرين:

1. إن الهدف من التدوير هو محاولة توزيع التباينات بشكل متقارب أو متساوي بين العوامل. فمثلا، لو نظرنا إلى العامل الأول قبل التدوير سنجد أنه كان يستحوذ على تباين قدره 40.323٪ وهو ما يوازي تقريباً مجموع التباينات للعوامل الثلاثة الباقية. أما بعد التدوير نجد أن التباين الذي يفسره نفس العامل أصبح يساوي 30.876٪ والفرق بين النسبتين تم توزيعه على باقي العوامل وهكذا.

2. لو رجعنا إلى الأمر الخاص بالتدوير **Rotation** ، وكنا قد اختربنا **None** ، [أي أننا لا نريد تدوير العوامل أو المصفوفة وسنكتفي بالعوامل المستخلصة فقط] ،

في هذه الحالة كنا سنجد أن البيانات الخاصة بالجزء الثالث غير موجودة. ويمكنك عزيزي القارئ تجربة ذلك بنفسك.

هام جداً:

الهدف من هذا الجدول هو التعرف على التحسن الذي أضافه أسلوب التدوير الذي تم اختياره، بحيث إذا كان الحل بعد التدوير (توزيع البيانات على العوامل) لم يختلف كثيراً عن الحل قبل التدوير، هذا يلفت نظراً إلى ضرورة تغيير إما طريقة استخلاص العوامل Extraction Method لأن نختار طريقة أخرى خلاف Principle Component أو اختيار أسلوب آخر للتدوير خلافاً لطريقة Varimax – كما سبق الإشارة إليه.

رابعاً: جدول مصفوفة المكونات Component Matrix (أو مصفوفة العوامل قبل التدوير): الموضحة بالشكل التالي:

Component Matrix^a


	Component			
	1	2	3	4
X10	.854			
X9	.843			
X11	.801	-.404		
X7	-.759			
X1	.688	.557		
X5	-.605		.587	
X6	-.591		-.527	.463
X4		.777		
X3	.509	.609		
X2		.552		-.499
X8			.766	

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 4 components extracted.

يعرض هذا الجدول التحميلات الخاصة بكل متغير على كل عامل من العوامل المستخلصة **قبل التدوير** وهو ما يمكن أن نسميه بدرجة ارتباط المتغير بكل عامل من العوامل.

ويلاحظ هنا أن هناك بعض القيم مكانها فارغ في الجدول. تفسير ذلك أننا قد طلبنا من البرنامج أن يكتفي بالتحميلات التي تزيد عن 0.35 (راجع المربع الحواري الخاص بـ **Options** والموضح بالشكل التالي)



خامساً: جدول مصفوفة المكونات بعد التدوير Rotated Component Matrix (أو مصفوفة العوامل بعد التدوير): الموضحة بالشكل التالي:

Rotated Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
X9	.939			
X10	.939			
X11	.787		-.428	
X4		.853		.433
X1	.438	.813		
X3		.748		
X6			.881	
X7	-.524		.751	
X2		.550	-.607	
X8				.873
X5	-.604			.624

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.

يتضمن هذا الجدول نفس البيانات التي تضمنها الجدول السابق ولكن بعد التدوير، أي أن هذا الجدول يعرض التحميلات الخاصة بكل متغير على كل عامل من العوامل المستخلصة **بعد** التدوير.

وهنا يتم تخصيص المتغيرات على العوامل حسب درجة ارتباط المتغير بالعامل، فمثلاً المتغيرات (X9, X10, X11) نجد أنهم أكثر ارتباطاً بالعامل الأول، لذا تم تخصيصهم على هذا العامل وهكذا لباقي المتغيرات. هذا بالإضافة إلى أنه تم ترتيب المتغيرات تنازلياً¹ داخل كل عامل حسب درجة الارتباط أو التحميل على العوامل كما يلي:

Options

1


: Sorted by size

- ❖ بالنسبة للعامل الأول: يضم المتغيرات (x_9 ثم x_{10} ثم x_{11}).
- ❖ وبالنسبة للعامل الثاني: نجد أنه يضم المتغيرات (x_4 ثم x_1 ثم x_3).
- ❖ أما العامل الثالث: فيضم المتغيرات (x_6 ثم x_7 ثم x_2).
- ❖ وأخيراً العامل الرابع: والذي يضم المتغيرات (x_8 ثم x_5).

وضع مسمى للعوامل:

تأتي هنا المرحلة الأخيرة من التحليل العاملی وهي مرحلة وضع مسمى للعوامل أو المكونات التي حصلنا عليها. ولابد هنا أن متواقة مع النظرية أو الظاهرة التي تحكم العلاقة بين المتغيرات الموجودة في التحليل. بمعنى لو المثال العملي الذي كنا بصدده الآن يتناول المتغيرات الخاصة بالسلوك الشرائي لمجموعة من المستهلكين لإحدى السلع. وبفرض أن المتغيرات التي يضمها العامل الأول هي كما يلي: المتغير (9) يقيس مستوى الدخل الشهري، والمتغير (10) يقيس مستوى الاستهلاك والمتغير (11) يقيس حجم الثروة الحالية للعائلة، في هذه الحالة نستطيع أن نسمي العامل الأول بالعامل الاقتصادي، وهكذا لباقي العوامل.

ومما لا شك فيه أن هذه المرحلة هي أصعب مراحل التحليل العاملی وتحتاج إلى مهارة خاصة من الباحث ووعي وفهم دقيق بأبعاد المشكلة التي يكون بصددها.



وفي النهاية:

نود التنويه على انه تم الاعتماد عند تفسير النتائج في هذا الفصل " التحليل العائلي " على المرجع الأكثر من رائع التالي :

Field, Andy P., (2005). Discovering statistics using spss (2nd edition), London, Sage. (Chapter 15).